

LEVANTAMENTO DOS *TYP*I DE ANGIOSPERMAS DO HERBARIUM ANCHIETA-PACA – INSTITUTO ANCHIETANO DE PESQUISAS – III

Maria Salete Marchioretto*

ABSTRACT

The present paper cares for divulgation and classification of Typi Annonaceae, Convolvulaceae, Euphorbiaceae, Leguminosae-Faboideae, Leguminosae-Mimosoideae, Melastomataceae, Myrtaceae and Poaceae of the Herbarium Anchieta (PACA), Instituto Anchietano de Pesquisas, São Leopoldo, RS, Brasil.

RESUMO

O presente trabalho trata da divulgação e classificação dos tipos das famílias Annonaceae, Convolvulaceae, Leguminosae-Faboideae, Leguminosae-Mimosoideae, Melastomataceae, Myrtaceae e Poaceae do Herbarium Anchieta (PACA), Instituto Anchietano de Pesquisas, São Leopoldo, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO

Dando continuidade na divulgação e classificação dos tipos do Herbarium Anchieta, apresentamos os tipos das famílias Annonaceae, Convolvulaceae, Euphorbiaceae, Leguminosae-Faboideae, Leguminosae-Mimosoideae, Melastomataceae, Myrtaceae e Poaceae, seguindo os critérios adotados por Occhione

* Bióloga, Pesquisadora e Curadora do Herbarium Anchieta (PACA) – Instituto Anchietano de Pesquisas.

Endereço: Praça Tiradentes, 35 – Caixa Postal 275 – 93001-970 – São Leopoldo, RS, Brasil.

Pesquisas	Botânica	Nº 48	1998	p. 53-110
-----------	----------	-------	------	-----------

(1949), Mendes Marques & Montalvo (1977), Ribeiro de Souza & Benevides de Abreu (1977), Valente (1977), Guimarães, Mautone & Rodrigues (1978), Wasum (1988, 1990).

Os critérios usados na elaboração do trabalho foram:

- a – citação da espécie;
- b – citação do autor e da obra original;
- c – citação do material *Typi*, como citado na descrição original;
- d – citação da sigla do Herbarium Anchieta;
- e – classificação dos *Typi*;
- f – citação das *schedulae* encontradas na ordem cronológica;
- g – fotografia dos *Typi*.

RELAÇÃO DAS ESPÉCIES APRESENTADAS NESTE TRABALHO

I – Família ANNONACEAE

1 – *Rollinia maritima* R. Záchia

Isotypus – PACA 54826

Paratypus – PACA 45236, PACA 71347

II – Família CONVOLVULACEAE

1 – *Ipomea ramboi* O'Donell

Isotypus – PACA 28183

III – Família EUPHORBIACEAE

1 – *Acalypha sehnemii* Allem & Irgang

Holotypus – PACA 9470

Isotypus – PACA 9095, PACA 9200

2 – *Croton calycireduplicatus* Allem

Holotypus – PACA 51528

Topotypus – PACA 51544

3 – *Croton ramboi* Allem

Holotypus – PACA 39052

Paratypus – PACA 38610, PACA 40956, PACA 45290

Topotypus – PACA 39005

4 – *Julocroton ramboi* Smith & Downs

Holotypus – PACA 49824

Paratypus – PACA 53719

IV – Família LEGUMINOSAE-FABOIDEAE

1 – *Adesmia araujoii* Burkart

Isotypus – PACA 3148

2 – *Adesmia rocinhensis* Burkart

Isotypus – PACA 53821

Paratypus – PACA 45367

- 3 – *Desmodium craspediferum* Azevedo & Oliveira
Holotypus – PACA 35064

V – Família LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

- 1 – *Mimosa aparadensis* Burk
Isotypus – PACA 32414
- 2 – *Mimosa balduini* Burkart
Isotypus – PACA 36179
Topotypus – PACA 71060
- 3 – *Mimosa coniflora* Burkart
Isotypus – PACA 66761
- 4 – *Mimosa ramboi* Burkart
Isotypus – PACA 26144
Paratypus – PACA 32812
- 5 – *Mimosa simulans* Burkart
Isotypus – PACA 51124

VI – Família MELASTOMATACEAE

- 1 – *Leandra balduinii* Brade
Holotypus – PACA 56295
- 2 – *Leandra camporum* Brade
Holotypus – PACA 55951
- 3 – *Leandra navicularis* Brade
Holotypus – PACA 56343
- 4 – *Leandra neglecta* Brade
Holotypus – PACA 52627
- 5 – *Leandra opaca* Brade
Holotypus – PACA 54485
- 6 – *Leandra planifilamentosa* Brade
Holotypus – PACA 53970
- 7 – *Leandra ramboi* Brade
Holotypus – PACA 56382
- 8 – *Miconia ramboi* Brade
Holotypus – PACA 55924
Paratypus – PACA 51361
- 9 – *Ossaea flacida* Brade
Isotypus – PACA 45002
- 10 – *Ossaea riograndensis* Brade
Holotypus – PACA 56393
Paratypus – PACA 45426, PACA 56591

VII – Família MYRTACEAE

- 1 – *Calyptrogenia hatschbachii* Legr.
Isotypus – PACA 36885

VIII – Família POACEAE

1 – *Stipa rhizomata* A. Zanin & Longhi-Wagner

Paratypus – PACA 60047

I – Família ANNONACEAE

1 – *Rollinia maritima* R. Záchia (Fotos 1, 2, 3)

Záchia, R. A. 1993; Uma nova espécie para o gênero *Rollinia* St.-Hil. (Annonaceae); **Bradea**. 6 (28); p. 242-247.

Holotypus: Brasil, Rio Grande do Sul, Torres: Rambo, B. s/nº, PACA nº 54826, 11 fev.1954. Prope litus in silvula arenosa, com flores, com fruto semi evoluto (B; Isotypus: PACA, HBR).

Paratypus: Brasil, Rio Grande do Sul, Capão da Canoa: Záchia, R. nº 571, na praia de Capão Novo, perto da fruteira e bar do Seu Costa, em matinha de duna, perto da Av. Paraguassú, fixado em FAA e ácido láctico 5: 1, 29 nov.1991 (ICN, SMDB, PEL, PACA, U, W); Osório: Rambo, B. s/nº, PACA 45236.

Exemplar PACA 54826 – Isotypus; PACA 45236 – Paratypus; PACA 71347 – Paratypus

1ª Sched.: 54826; *Rollinia emarginata* Schl.; 11.2.1954.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo, RS – PACA 54826 Annonaceae; *Rollinia emarginata* Schl.; RS, Torres; Prope litus in silvula arenosa; 11.2.1954, fl. fr. semievoluto; Leg. et det. B. Rambo SJ; Sicher, 4.5.1954. Observação: *Rollinia maritima* R. Záchia; (Isotypus); Det. R. Záchia 28.IV.1993 (Hb. ICN – UFRGS); Porto Alegre – Rio Grande do Sul.

II – Família CONVULVACEAE

1 – *Ipomea ramboi* O'Donell (Foto 4)

O'Donell, C. A., 1960; Convolvulaceas Argentinas II; **Lilloa** – Revista de Botanica, publicada pela Universidad Nacional de Tucuman, Instituto Miguel Lillo; Tomo XXX. p. 48-50.

Tipo: (LIL 170652) Brasil, Rio Grande do Sul, Nonoaí; Leg. P. B. Rambo (28183) 5.III.1945.

Exemplar PACA 28183 – Isotypus

1ª Sched.: 28183; *Ipomea variifolia* Meissner. RS, Nonoaí p. fl. Uruguay (em estenografia) 3.12.1946.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo, RS – PACA 28183; Convolvulaceae; *Ipomea ramboi* O'Donell; RS, Nonoaí p. fl. Uruguay; In campestribus dumetosis scandens; 3.1945, fl.; Leg. B. Rambo SJ; Det. Carlos A. O'Donell; 1960; Observação: Emrich-Rambo det. como *I. viriifolia* Meissner em 21.07.1954.

III – Família EUPHORBIACEAE

1 – *Acalypha sehnemii* Allem & Irgang (Fotos 6, 7)

Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1976; Nuevas espécies de Euphorbiaceae de America del Sur. I.; **Boletín de La Sociedad Argentina de Botánica**; volumen XVII, nº 3-4. p. 301-306.

Holotypus: Brasil, Rio Grande do Sul, Município de Tupanciretã (Jari). 26/01/1942. Rambo s/nº (PACA 9470).

Exemplar PACA 9470 – Holotypus; PACA 9095 – Isotypus; PACA 9200 – Isotypus

1ª Sched.: 9470; Euphorbiaceae; Tupanciretan, Jarí, Arr. Cachoeira; In campo; 26.1.1942; L. Rambo; *Acalypha* sp.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS – PACA 9470; Euphorbiaceae; *Acalypha sehnemii* Allem & Irgang; RS, Tupanciretan, Jarí; In campestribus dumetosis; 26.01.1942, fr; Det. A. Allem & B. Irgang – 1975. Observação: Emrich-Rambo det. como *Acalypha*.

2 – *Croton calycireduplicatus* Allem (Fotos 8, 9)

Allem, A. C., 1979; Quatro novas espécies de *Croton* L. (Euphorbiaceae) do Rio Grande do Sul, Brasil; **Boletín de La Sociedad Argentina de Botánica**; Volumen XVII; nº 3-4. p. 63-81.

Holotypus: Brasil, Rio Grande do Sul: Vacaria, Passo do Socorro; em campos secos arbustivos, 27.XII.1951, Rambo nº PACA 51528 (feminino).

Topotypus: Vacaria, Passo do Socorro, 26.XII.1951, Rambo nº PACA 51544 (masculino).

Exemplar PACA 51528 – Holotypus; PACA 51544 – Topotypus

1ª Sched.: 51528; *Croton helichrysum* Baill; 27.12.51; Socorro.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta, Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas, São Leopoldo – RS; PACA 51528; Euphorbiaceae; *Croton calycireduplicatus* Allem; typus – exemplar feminino; RS, Passo do Socorro p. Vacaria; In campestribus dumetosis; 27.12.1951, fl. fr.; Leg. B. Rambo SJ; Det. Antonio Allem. Obs: Emrich-Rambo det. como *C. helichrysum* Baill. em 02.12.1955.

3 – *Croton ramboi* Allem (Fotos 10, 11, 12, 13, 14)

Allem, A. C., 1979; Quatro novas espécies de *Croton* L. (Euphorbiaceae) no Rio Grande do Sul, Brasil; **Boletín de La Sociedad Argentina de Botánica**; Volumen XVII, nº 3-4. p. 63-81.

Holotypus: Brasil, Rio Grande do Sul: São Leopoldo, Morro de Steinkopf, em campos rupestres, 20.XII.1948, Rambo nº 39052 (feminino).

Paratypus: Morro das Cabras, em campo, 07.XII.1948, Rambo nº 38610 (feminino), 08.IV.1949, Rambo nº PACA 40956 (feminino) – Gravataí, Morro do Itacolomí, em campos rupestres, 11.I.1950, Rambo nº 45290 (masculino).

Topotypus: São Leopoldo, Morro de Steinkopf, em campos rupestres, 20.XII.1948, Rambo nº 39005 (masculino).

Exemplar PACA 39052 – Holotypus; PACA 38610 – Paratypus; PACA 40956 – Paratypus; PACA 45290 – Paratypus; PACA 39005 – Topotypus

1ª Sched.: 39052; *Croton helichrysum* Baill.; 20.12.1948.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; PACA 39052; Euphorbiaceae; *Croton ramboi* Allem, RS, Steinkopf p. São Leopoldo, fl. Leg. B. Rambo SJ; Det. Antonio Allem. Obs: Emrich-Rambo det. como *Croton helichrysum* Baill. em 30.07.1954.

4 – *Julocroton ramboi* Smith & Downs (Fotos 15, 16)

Smith, L. B. & Downs, R. J., 1959; Notulae Euphorbiacearum: **Sellowia** 11:153. fig 14.

N. 49824 – B. Rambo, s/nº, na mata virgem pelo Rio Uruguai, Itapiranga, Santa Catarina, em 6-2-1951 (tipo). N. 53719 – Rambo, s. n., mesmo lugar, em 17-1-1953.

Exemplar PACA 49824 – Holotypus; PACA 53719 – Paratypus

1ª Sched.: 49824; *Julocroton triqueter* (Baill.) M. A.; P. Novo; 6.2.1951.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; B. Rambo SJ – Colégio Anchieta; Porto Alegre; 49824; *Julocroton triqueter* (Baill.) M. Arg.; SC, Itapiranga ad fl. Uruguay; In silva primaeva; 6.2.1951; Leg B. Rambo SJ; Det. Emrich-Rambo.

3ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; PACA 49824; Euphorbiaceae; *Julocroton ramboi* Smith & Downs; SC, Itapiranga ad fl. Uruguay; Ad silvam primaevam; 6.2.1951, fl.; Leg. B. Rambo SJ; Det. Smith & Downs. Obs: Emrich-Rambo det. como *J. triqueter* (Baill.) M. Arg. em 31.07.1954.

4ª Sched.: United States National Herbarium; *Julocroton ramboi* Smith & Downs; Type.

IV – Família LEGUMINOSAE-FABOIDEAE

1 – *Adesmia araujo* Burkart (Foto 17)

Burkart, A. 1939; Estudios sistemáticos sobre las Leguminosas-Hedisareas de la República Argentina y regiones adyacentes; **Darwiniana** 3 (2): 130.

Material estudiado. – Brasil: Rio Grande do Sul, Tupanciretã, a orilla del ferrocarril, Araujo 261, enero de 1938; S. I. (Typus).

Exemplar PACA 3148 – Isotypus

1ª Sched.: Leguminosae P.; *Adesmia araujo* Burkart n. sp.; Tupanciretan, Posto Zootécnico; In campo; L. Anacreonte de Araujo.

2ª Sched.: Herbário de Anacreonte Avila de Araujo; Fam.; n. 261; Nome latino *Adesmia araujo* Burkart; Nome vulgar Babosa serrana; Data Nov. 1938; Procedencia Tupancireta; Colhido por Anacreonte A. Araujo; Determinado A. Burkart; Observações colhida em um corte da V. Ferrea perto do Posto Zootécnico.

3ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; PACA 3148; Leguminosae-Faboideae; *Adesmia araujo* Burkart; RS, Posto Zootécnico p. Tupanciretan; In campestribus

graminosis; 11.1938, fl. fr. semievoluto; Leg. A. A. de Araujo; Det. A. Burkart; Sicher, 14.8.1954.

4ª Sched.: UEC; *Adesmia araujoi* Burk.; Det. Silvia Miotto, Nov./1990.

2 – *Adesmia rocinhensis* Burkart (Fotos 18, 19)

Burkart, A. 1962; Contribución al estudio del género *Adesmia* (Leguminosae), IV; *Darwiniana* 12(3).321.

Brasil: Rio Grande do Sul, Serra da Rocinha prope Bom Jesus, in campestribus humidis, leg. Balduino Rambo S.J., 03.II.1953, Herb. "Anchieta" nº 53821 (typus speciei: SI; dupl. S). Aparados da Rocinha pr. Bom Jesus, in dumetosis subturfosis prostato-adscondens, leg. ipso 18.I.1950 "semel forsan nova" Herb. "Anchieta" 45367 (SI).

Exemplar PACA 53821 – Isotypus; PACA 45367 – Paratypus

1ª Sched.: 53821; *A. macrostachya*; *punctata* Bth; 3.2.53.

2ª Sched.: 53821; *Adesmia punctata* (Poir.) DC.; 3.2.53; N. Mattos 1968!

3ª Sched.: Herbarium Anchieta, Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; Isotypus; 53821 PACA; Leguminosae-Faboideae; *Adesmia rocinhensis* Burk; RGS, Serra da Rocinha p. Bom Jesus; In campestribus graminosis; 3.2.1953 – fl. fr.; Leg. B. Rambo SJ; Det. Silvia Miotto em XI.1990; Obs: N. Mattos em 1968 det. *Adesmia punctata* (Poir.) DC.

4ª Sched.: UEC; *Adesmia rocinhensis* Burk.; Det. Silvia Miotto; Nov./1990.

3 – *Desmodium craspediferum* Azevedo & Oliveira (Foto 20)

Azevedo, A. M. G. 1982; Uma nova espécie para o gênero *Desmodium* Desv. (Leguminosae-Papilionoideae): *Desmodium craspediferum* Azevedo & Oliveira; *Revta. Brasil. Bot.* 5: 1-3.

Holotypus: Brasil – Rio Grande do Sul: Vacaria, Fazenda da Ronda, 11/II/1947, B. Rambo, SJ. 35064 (PACA).

Exemplar PACA 35064 – Holotypus

1ª Sched.: 35064; *Desmodium hickenianum* Burk.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta, Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; PACA 35064; Leg-Faboideae; *Desmodium craspediferum* Azevedo & Oliveira; RS, Faz. da Ronda p. Vacaria; In campestribus siccis dumetosis; 11.1.1947, fl. fr. submaturo; Leg. B. Rambo SJ; Det. A. M. G. Azevedo-Tozzi em 1982; Obs: Emrich-Rambo det. como *Desmodium hickenianum* Burkart em 15.08.1954.

3ª Sched.: UEC; HOLOTYPE; *Desmodium craspediferum* Azevedo & Oliveira; *Rev. Brasil. Bot.* 5: 1-3. 1982; Det. A. M. G. Azevedo-Tozzi/1982.

V – Família LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

1 – *Mimosa aparadensis* Burk. (Foto 21)

Burkart, A. 1964; Sinopsis de las especies de *Mimosa* de la serie Lepidota; *Darwiniana* 13 (2-4). p. 394.

Brasilia australis, Rio Grande do Sul in montibus praeruptis Aparados dictis. Typus: B. Rambo 32414 ex Herb. Anchieta in SI.

Exemplar PACA 32414 – Isotypus

1ª Sched.: *M. pilulifera* Burk.; 32414.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; 32414 PACA; Holotypus; Leg. Mimosoideae; *Mimosa aparadensis* Burk.; RS, Serra da Rocinha p. Bom Jesus; In silvula nebulari; 28.02.1946 – fl. nondum aperto; Leg. B. Rambo SJ; Det. Burkart; Sicher 13.8.1954.

2 – *Mimosa balduini* Burkart (Fotos 22, 23)

Burkart, A. 1951; Leguminosae nuevas o críticas, IV; **Darwiniana** 9 (3-4). p. 391.

Brasil. Rio Grande do Sul, Cambará, Serra da Pedra, Município de S. Francisco de Paula, a aproximadamente 29º lat. S y 50º long. oeste de G., cerca de los precipicios "Aparados" a unos 1000m sobre el mar, en la orilla de bosques, leg. Balduino Rambo S.J., 6.II.1948, Herbarium Anchieta, Porto Alegre, Nº 36170 (dupl. SI: typus speciei). "Species prima vice in R.G. do S. a me in venta. Arbuscula circ. 4m alta, trunco valde spinoso 15 cm diám. Habitus fere *M. sepiaiae* Benth".

Exemplar PACA 36179 – Isotypus; PACA 71060 – Topotypus

1ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; 36179 PACA; Isotypus; Mimosaceae; *Mimosa balduini* Burkart; RGS – Serra da Pedra p. Cambará; Ad silvam nebulem in rupestribus; 02.1948 – fl. nondum evoluto fr. ant.; leg. B. Rambo SJ; det. A. Burkart; Sicher 13.08.1954.

3 – *Mimosa coniflora* Burkart (Foto 24)

Burkart, A. 1979; Leguminosae Mimosoideae; **Flora Illustrata Catarinense** p. 226-229.; Tipo – Santa Catarina: Garuva: Morro do Campo Alegre, beira rio, 1200m, flor roxa, Reitz & Klein 10.997 (24.03.1961) SI.

Exemplar PACA 66761 – Isotypus

1ª Sched.: Plantas de Santa Catarina – Brasil: Família Leguminosae/Mim.; N. Científico *Mimosa coniflora* Burkart n. sp.; sin-var.; Nome vulgar; Localidade Morro do Campo Grande, Garuva; Habitat beira de rio; Altit. 1200m; Hábito arbusto; Altura 2m; Flor (cor, odor, etc.) roxa; Fruto (tamanho, odor, cor, etc); Colecionador Reitz & Klein N. 10.997; Data 24.03.1961; Determinador A. Burkart; Data 1973; Observações (usos e econômic, abundância, etc.) Isotypus n. sp; PACA 66761.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; PACA 66761; Leguminosae-Mimosoideae; Isotypus; *Mimosa coniflora* Burkart; SC, Garuva – Morro do Campo Alegre; Beira de rio; Col. Reitz & Klein nº 10997; data 24.03.1961; Det. A. Burkart – 1973.

4 – *Mimosa ramboi* Burkart (Fotos 25, 26, 27)

Burkart, A. 1946; Leguminosae nuevas o críticas; **Darwiniana** 7 (2) p. 227-231.

Brasil. Rio Grande do Sul, parte sudoeste, rio Quaraí-Mirim (afluente del Cuareim), Estancia do Jarau, B. Rambo 26144, I.1945. (Herb. Col. Anchieta, typus SI). – De la misma región, com Rambo 26144, bis XII.1945 (SI).

Exemplar PACA 26144 – Isotypus; PACA 32812 – Paratypus

1ª Sched.: *M. ramboi* Burk.; 26144

2ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; PACA 26144; Leg-Mimosoideae; *Mimosa ramboi* Burkart (Typus!); Faz. do Jarau p. Quaraí; in campestribus saxosis dumetosis; 1.1945, fl; Leg. B. Rambo SJ; Det. A. Burkart; Sicher, 13.8.1954.

5 – *Mimosa simulans* Burk. (Foto 28)

Burkart, A. 1964; Sinopsis de las especies de *Mimosa* de la serie Lepidota; **Darwiniana** 13 (2-4). p. 402-404.

Brasil, Rio Grande do Sul. Typus: Montenegro, Aloysio Sehnem 5044 (SI). Exemplar PACA 51124 (ASSL 5044) – Isotypus

1ª Sched.: 51124; 5044; L. Pinhal; Arbustum in dumeto; 20.11.1950; Lg. A. S.; *M. daleoides*.

2ª Sched.: Plantas do Sul do Brasil; Nº 5044; Cl.; Fam. Mimosaceae; N.C. *Mimosa daleoides* Benth.; N. V.; Localidade RS – Linha Pinhal; Habitat arbustum in dumeto; data 20.11.1950; Alt.; Leg. A. Sehnem; Det. B. Rambo; Observações Herbário PACA 51124; Coleção de P. Aloysio Sehnem S.J. (ASSL).

3ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; 51124 PACA; Leg – Mimosoideae; *Mimosa daleoides* Benth.; RS, Linha pinhal p. Montenegro; In dumetosis; 20.11.1950. fr. semievoluto; Leg. A. Sehnem 5044; Det. Emrich-Rambo; Sicher – 13.08.1954.

4ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; 51124 PACA; Leg-Mimosoideae; Isotypus; *Mimosa simulans* Burk.; RGS – Linha Pinhal p. Montenegro; in dumetosis; 20.11.1950. fr. semievoluto; Leg. A. Sehnem 5044; Det. Burkart em 1964.

VI – Família MELASTOMATACEAE

1 – *Leandra balduinii* Brade (Foto 29)

Brade, A. C. 1957; Melastomataceae novas do Estado do Rio Grande do Sul; **Sellowia** 8. p. 369-370; Habitat: Brasília, Rio Grande do Sul, Fazenda Englert pr. São Francisco de Paula, in araucarieto, 22.1.1955, leg. Balduino Rambo SJ nº 56295. "Typus" in Herbario Anchieta, Colegio Anchieta, Porto Alegre.

Exemplar PACA 56295 – Holotypus

1ª Sched.: 56295; *L. balduinii* Brade; d. Brade; 2.1.55.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta, Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; PACA 56295; Melastomataceae;

Holotypus; *Leandra balduinii* Brade; RS, Faz. Englert p. S. Francisco de Paula; In araucarieto, 2.1.1955, fl.; Leg. Rambo SJ; Det. Brade; Sicher, 1.5.1955.

2 – *Leandra camporum* Brade (Fotos 30, 31)

Brade, A.C. 1957; Melastomataceae novas do Estado do Rio Grande do Sul; **Sellowia** 8. p. 370-371.; Habitat: Brasília, Estado do Rio Grande do Sul, Taimbézinho pr. São Francisco de Paula, in campestribus dumetosis, 3.11.1954. Leg. Balduino Rambo SJ. Nº 55951. – "Typus" in Herbário Anchieta, Colégio Anchieta, Porto Alegre.

Exemplar PACA 55951 – Holotypus

1ª Sched.: 55951; *Leandra camporum* Brade; 3.11.54; L. Brade.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta, Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; 55951 PACA; Melastomataceae; Holotypus; *Leandra camporum* Brade; RS – Taimbezinho p. S. Francisco de Paula; in campestribus dumetosis; 3.11.1954-fl; Legit B. Rambo SJ; Det. Brade; Sicher 1.5.1955.

3 – *Leandra navicularis* Brade (Foto 32)

Brade, A. C. 1957; Melastomataceae novas do Estado do Rio Grande do Sul; **Sellowia** 8 p. 368-369; Habitat: Brasília, Estado do Rio Grande do Sul, Fazenda Englert, p. São Francisco de Paula, in araucarieto, 2.1.1955. Leg. Balduino Rambo SJ Nº 56343. "Typus" in Herbário Anchieta, Colégio Anchieta, Porto Alegre.

Exemplar PACA 56343 – Holotypus

1ª Sched.: 56343; *Leandra navicularis* Brade; typus; 2.1.55; d. Brade.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta, Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas, São Leopoldo – RS; 56343 PACA; Melastomataceae; Holotypus; *Leandra navicularis* Brade; RGS – Faz. Englert p. São Francisco de Paula; in araucarieto; 2.1.1955-fl.; Legit. B. Rambo SJ; Det. Brade; Sicher, 1.5.1955.

4 – *Leandra neglecta* Brade (Foto 33)

Brade, A. C. 1957; Melastomataceae novas do Estado do Rio Grande do Sul; **Sellowia** 8. p. 375-376; Habitat: Brasília. Estado de Santa Catarina, Serra do Fachinal pr. Biguaçu, in araucarieto, 20.7.1951; Leg. Balduino Rambo SJ N. 52627. "Typus": in Herbário Anchieta; Colégio Anchieta, Porto Alegre.

Exemplar PACA 52627 – Holotypus

1ª Sched.: 52627; 20.7.1951; *L. viridiflava* Brade

2ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; PACA 52627; Melastomataceae; *Leandra neglecta* Brade; SC, Serra do Fachinal p. Biguaçu; In silva montana; 20.07.1951; fl. subaperto; Leg. B. Rambo SJ; Det. Brade 1957; Obs: Emrich-Rambo det. como Miconia.

5 – *Leandra opaca* Brade (Foto 34)

Brade, A. C. 1957; Melastomataceae novas do Estado do Rio Grande do Sul; **Sellowia** 8. p. 373-374; Habitat: Brasília, Estado do Rio Grande do Sul; Taimbézinho pr. São Francisco de Paula, in araucarieto, 13.11.1953. Leg.

Balduino Rambo SJ Nº 54485. "Typus": in Herbário Anchieta, Colégio Anchieta, Porto Alegre.

Exemplar PACA 54485 – Holotypus

1ª Sched.: 54485; *L. circunscina*; *velutina*; *opaca* Brade; 13.11.53; d. Brade.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; 54485 PACA; Holotypus; Melastomataceae; *Leandra opaca* Brade; RGS – Taimbesinho p. São Francisco de Paula; in araucarieto; 13.11.1953-fl.; Legit B. Rambo SJ; det. Brade; Sicher 27.8.1954.

6 – *Leandra planifilamentosa* Brade (Foto 35)

Brade, A. C. 1957; Melastomataceae novas do Estado do Rio Grande do Sul; **Sellowia** 8. p. 371-372; Habitat: Brasília. Estado do Rio Grande do Sul, Taimbézinho pr. São Francisco de Paula; in araucarieto; 20.2.1953. Leg. Balduino Rambo S.J. 53.970. "Typus": Herbário Anchieta, Colégio Anchieta, Porto Alegre.

Exemplar PACA 53970 – Holotypus

1ª Sched.: 53970; *L. planifilamentosa* Brade; d. Brade; 20.2.53.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; PACA 53970; Melastomataceae; *Leandra planifilamentosa* Brade; RS, Taimbesinho p. São Francisco de Paula; In araucarieto; 20.03.1953, fr. semievoluto; Leg. B. Rambo SJ; Det. Brade; Sicher, 11.6.1955.

7 – *Leandra ramboi* Brade (Foto 36)

Brade, A. C. 1957; Melastomataceae novas do Estado do Rio Grande do Sul; **Sellowia** 8. p. 374-375; Habitat: Brasília. Estado do Rio Grande do Sul, Fazenda Englert pr. São Francisco de Paula, in araucarieto. Leg. Balduino Rambo S.J. 21.1.1955 N. 56382 – "Typus" in Herbário Anchieta, Colégio Anchieta, Porto Alegre.

Exemplar PACA 56382 – Holotypus

1ª Sched.: 56382; *Leandra ramboi* Brade; Tipi; 2.1.1955; d. Brade.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; 56382 PACA; holotypus; Melastomataceae; *Leandra ramboi* Brade; RGS – Faz. Englert p. São Francisco de Paula; ad araucarietum in dumetosis; 2.1.1955-fl. Leg. B. Rambo SJ; Det. Brade; Sicher 1.5.1955.

8 – *Miconia ramboi* Brade (Fotos 37, 38)

Brade, A. C. 1957; Melastomataceae novas do Estado do Rio Grande do Sul; **Sellowia** 8. p. 376-377; Habitat: Brasília. Estado do Rio Grande do Sul: Taimbézinho pr. São Francisco de Paula, 5.2.1951, leg. Balduino Rambo SJ Nº 51631. Idem, in araucarieto, leg. Balduino Rambo nº 55924, 3.11.1954; "Typus" in Herbário Anchieta, Porto Alegre.

Exemplar PACA 55924 – Holotypus; PACA 51361 – Paratypus

1ª Sched.: 55924; *Mic. ramboi* Brade; Typus; 3.11.1954; d. Brade.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; Holotypus PACA 55924; Melastomataceae; *Miconia ramboi* Brade; RS, Taimbesinho p. S. Francisco de Paula; In araucarieto; 3.11.1954, fl.; Leg. B. Rambo SJ; Det. Brade; Sicher, 1.5.1955.

9 – *Ossaea flacida* Brade (Foto 39)

Brade, A. C. 1957; Melastomataceae novas do estado do Rio Grande do Sul; **Sellowia** 8. p. 377; Habitat: Brasília. Estado do Rio Grande do Sul, Gramado pr. Canela, in araucarieto. 26.12.1949. Leg. Balduino Rambo S. J. Nº 45003. "Typus": in Herbário Anchieta, Colégio Anchieta, Porto Alegre.

Exemplar PACA 45002 – Isotypus

1ª Sched.: 45002; *Ossaea ramboi* Brade; 26.12.49; *flacida*; d. Brade;

2ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas – São Leopoldo – RS; PACA 45002; Melastomataceae; Isotypus; *Ossaea flacida* Brade; RS, Gramado p. Canela; In araucarieto, 26.12.1949, fl.; Leg. B. Rambo SJ; Det. Brade; Sicher, 01.05.1955.

10 – *Ossaea riograndensis* Brade (Fotos 40, 41, 42)

Brade, A. C. 1957; Melastomataceae novas do Estado do Rio Grande do Sul; **Sellowia** 8. p. 378-379; Habitat: Brasília. Estado do Rio Grande do Sul, Fazenda Englert pr. São Francisco de Paula, in araucarieto, 2.1.1955, Leg. Balduino Rambo S.J. 56.393 – "Typus" in Herbário Anchieta, Colégio Anchieta, Porto Alegre; Rio Grande do Sul, Bom Jesus, leg. Balduino Rambo S.J. Nº 45426; Rio Grande do Sul, Vila Oliva pr. Caxias, 8.2.1955, leg. B. Rambo S.J. Nº 56591.

Exemplar PACA 56393 – Holotypus; PACA 45426 – Paratypus; PACA 56591 – Paratypus

1ª Sched.: 56393; *Ossaea riograndensis* Brade; Typus; 2.1.55; d. Brade.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; 56393 PACA; Melastomataceae; Holotypus; *Ossaea riograndensis* Brade; RGS – Faz. Englert p. São Francisco de Paula; ad araucarietum in dumetosis; 2.1.1955 – fr. Leg. B. Rambo SJ; Det. Brade; Sicher 1.5.1955.

VII – Família MYRTACEAE

1 – *Calyptrigenia hatschbachii* Legr. (Foto 43)

Legrand, D. C. 1958; Las especies de los generos Caliptriformes del Brasil – Metranthes Berg y Calyptrigenia Burr.; **Comunicações Botánicas del Museo de Historia Natural de Montevideo** 3 (36): 8; Brasil: Estado do Paraná, Município Piraquara, Florestal 930 m; Hatschbach 577 (MVM).

Exemplar PACA 36885 – Isotypus

1ª Sched.: Herbario Hatschbach, N 577; N.C.; N.V. Bofe, Pau de cove; Fam. Myrtaceae; Est. Paraná; Mun. Piraquara; Loc. Florestal; Alt. 930m. Data 25/XII/1946; Obs. árvore 4m, flor branca; Leg. Hatschbach; Det.

2ª Sched.: PACA 36885; Hatschbach 577; *Calyptrigenia hatschbachii* Legr.; Det. M. Sobral, Jul. 1983; Obs. V. Legrand, C. D. 1958; Com. Bot. Mus. Montevideo 3 (36): 8.; esta coleta é um isotipo.

3ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas: São Leopoldo – RS; 36885 PACA; Myrtaceae; *Calyptrigenia hatschbachii* Legr.; Pr. Florestal, Piraquara; 25.XII.1946, fl.; Leg. Hatschbach (577); det. M. Sobral, Jul. 1983; Obs: Isotipo.

VIII – Família POACEAE

1 – *Stipa rhizomata* A. Zanin & Longhi-Wagner (Foto 44)

Zanin, A. & Longhi-Wagner, H. M. 1990; Espécies novas de *Stipa* L. (Gramineae) no Sul do Brasil. **Bradea** (5) 33: 345-346; Paratypus: Brasil – Santa Catarina: Bom Retiro, 24 jan. 1957, Rambo s/n (PACA 60047).

Exemplar PACA 60047 – Paratypus

1ª Sched.: 60047; *Piptochaetium* sp; C. Padres, 24.1.1957.

2ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; 60047; PACA; Gramineae; *Piptochaetium*; SC, Campo dos Padres; In campestribus subhumidis; 24.1.1957.fr.; Leg. B. Rambo SJ; Det. Emrich-Rambo; Sicher, 1.5.1957.


3ª Sched.: Herbarium Anchieta; Florae Brasiliae Australis; Instituto Anchieta de Pesquisas; São Leopoldo – RS; 60047; PACA; Gramineae – paratypus; *Stipa rhizomata* A. Zanin & Longhi-Wagner; SC, Campo dos Padres; in campestribus subhumidis; 24.01.1957.fr.; Leg. B. Rambo SJ; Det. A. Zanin 30.III.1990; Obs: Emrich-Rambo em 1.5.1957 det. como *Piptochaetium*.

4ª Sched.: Centro Nacional de Recursos Genéticos-Cenergen; *Stipa rhizomata* A. Zanin & Longhi-Wagner; Paratypus; Det. Ana Zanin; 30.03.1990.

BIBLIOGRAFIA

- ALLEM, A. C., 1979. Quatro novas espécies de *Croton* L. (Euphorbiaceae) do Rio Grande do Sul, Brasil. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 18 (3-4): 63-81.
- ALLEM, A. C. & IRGANG, B. E., 1976. Nuevas espécies de Euphorbiaceae de America del Sur. I. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 17 (3-4): 301-306.
- AZEVEDO, A. M. G., 1982. Uma nova espécie para o gênero *Desmodium* Desv. (Leguminosae-Papilionoideae): *Desmodium craspediferum* Azevedo & Oliveira. Revta. Brasil. Bot. 5: 1-3.
- BURKART, A., 1939. Estudios sistemáticos sobre las Leguminosae-Hedisareas de la República Argentina y regiones adyacentes. Darwiniana 3 (2): 130.
- _____, 1946. Leguminosae nuevas o críticas. Darwiniana 7 (2): 227-231.
- _____, 1951. Leguminosae nuevas o críticas. IV. Darwiniana 9 (3-4): 391.
- _____, 1962. Contribución al estudio del género *Adesmia* (Leguminosae). IV. Darwiniana 12 (3): 321.
- _____, 1964. Sinopsis de las especies de *Mimosa* de la serie *Lepidota*. Darwiniana 13 (2-4): 394-404.
- _____, 1979. Leguminosae Mimosoideae. Flora Illustrada Catarinense. 226-229.
- BRADE, A. C., 1957. Melastomataceae novas do Estado do Rio Grande do Sul. Sellowia 8: 368-379.

- GUIMARÃES, E. F., MAUTONE, L. E., RODRIGUES, J. A., 1978. Levantamento dos tipos do Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ochnaceae. *Rodriguesia* 30 (46): 203-251. 19 fotos.
- LEGRAND, D. C., 1958. Las especies de los generos Calyptiformes del Brasil – *Mitranthes* Berg y *Calyptrogenia* Burr. *Comunicações del Museo de Historia Natural de Montevideo* 3 (36): 8.
- MARQUES, M. do C. M. & MONTALVO, E. A., 1977. Levantamento dos tipos do Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Bignoniaceae I. *Arq. do Jard. Bot. do Rio de Janeiro*, 20: 63-75.
- OCCHIONI, P., 1949. Lista de "Typus" – do Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. *Lilloa* 27: 419-487.
- O'DONELL, C. A., 1960. *Convolvulaceas Argentinas II*. *Lilloa* 33: 48-50.
- SMITH, L. B. & DOWNS, R. J., 1959. *Notulae Euphorbiacearum*. *Sellowia* 11: 153. fig.14.
- SOUZA, A. F. R. & ABREU, C. L. B., 1977. Levantamento dos Tipos do Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro – Leguminosae-Caesalpinioideae II. *Arq. do Jard. Bot. do Rio de Janeiro* 20: 93-115. 22 fotos.
- VALENTE, M. da C., 1977. Levantamento dos "Tipos" das espécies de Passifloraceae e Rhizophoraceae do Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. *Arq. do Jard. Bot. do Rio de Janeiro* 20: 21-27. 6 fotos.
- WASUM, R. A., 1988. Levantamento dos Tipos do Herbarium Anchieta – Instituto Anchieta de Pesquisas I. *Pesquisas* 39: 115-125. 9 fotos.
- _____, 1990. Levantamento dos Tipos do Herbário Anchieta Compositae, Gesneriaceae e Umbelliferae – Instituto Anchieta de Pesquisas – II. *Pesquisas* 41: 85-98. 9 fotos.
- ZACHIA, R. A. 1993. Uma nova espécie para o gênero *Rollinia* St.-Hil. (Annonaceae). *Bradea* 6 (28): 242-247.
- ZANIN, A. & LONGHI-WAGNER, H. M., 1990. Espécies novas de *Stipa* L. (Gramineae) do Sul do Brasil. *Bradea* 5 (33): 345-346.

Foto 01 - *Rollinia maritima* R. Záchia - Isotypus.





Foto 02 – *Rollinia maritima* R. Záchia – Paratypus.

Foto 03 – *Rollinia maritima* R. Záchia – Paratypus.




Foto 04 - *Ipomea ramboi* O'Donell - Isotypus.





Foto 05 - *Acalypha sehnemii* Allem & Irgang - Holotypus.

9095



9095

5 cm

PACA 9095

Euphorbiaceae

Herbarium Anchieta

Flora Brasiliæ australis
 Instituto Anchieta de Pesquisas
 São Leopoldo - RS

Acalypha sehnmii Allem & Irgang

RS, Tupanciretã - Jarí
 In campestribus dumetosis
 26.01.1942, fr.
 Leg. B. Rambo SJ
 Det. A. Allem & B. Irgang- 1975

Euphorbiaceae

Tupanciretã - Jarí
 In campo
 25.1.1942

L. Rambo




Foto 07 – *Acalypha sehnmii* Allen & Irgang – Isotypus.

Foto 08 – *Croton calycireduplicatus* Allem – Holotypus.




Foto 09 – *Croton calycireduplicatus* Allen – Topotypus.



Foto 10 – *Croton ramboi* Allem – Holotypus.




Foto 11 – *Croton ramboi* Allem – Paratypus.




Foto 12 – *Croton ramboi* Allem – Paratypus.




Foto 13 – *Croton ramboi* Allen – Paratypus.






Foto 14 – *Croton ramboi* Allem – Topotypus.

Foto 15 – *Julocroton ramboi* Smith & Downs – Holotypus.

Foto 16 – *Julocroton ramboi* Smith & Downs – Paratypus.

Herbario

de ANACREONTE AVILA DE ARAUJO

Herbarium Anchieta

Flora Brasiliæ australis
Instituto Anchieta de Pesquisas
São Leopoldo - RS

PACA 3148

Leguminosae- faboi-
deae

Fam.

N. 261

Nome latino *Adesmia araujoii* Burkart

Nome vulgar *Balsora serrana*

Data 11.1938 Procedência Tupaciretã

Colhido por Anacreonte A. Araújo

Determinado A. Burkart

Observações *batizada em um*

Faixa para do Posto Zootécnico.

Adesmia araujoii Burkart

RS, Posto Zootécnico p. Tupanciretã


In campestribus graminosis

11.1938, fl. fr. semievoluto

leg. A.A. de Araújo

Det. A. Burkart

Sicher, 14.8.1954



5 cm

Leguminosae P.

Adesmia araujoii Burkart n. sp.

Tupanciretã, Posto Zootécnico

In campo,

A. Anacreonte de Araújo




UEC


Adesmia araujoii Burk

Det. *Silva*

nr 1190

Foto 17 - *Adesmia araujoii* Burkart - Isotypus.

Foto 18 – *Adesmia rocinhensis* Burkart – Isotypus.

Foto 19 – *Adesmia rocinhensis* Burkart – Paratypus.




Foto 20 – *Desmodium craspediferum* Azevedo & Oliveira – Holotypus.




Foto 21 - *Mimosa aparadensis* Burk. - Isotypus.




Foto 22 - *Mimosa balduini* Burkart - Isotypus.





Foto 23 – *Mimosa balduini* Burkart – Topotypus.

Foto 24 - *Mimosa confiflora* Burkart - Isotypus.




Foto 25 – *Mimosa ramboi* Burkart – Isotypus.




Foto 26 - *Mimosa ramboi* Burkart - Paratypus.





Foto 27 – *Mimosa ramboi* Burkart – Paratypus.

Foto 28 - *Mimosa simulans* Burkart - Isotypus.




Foto 29 – *Leandra balduinii* Brade – Holotypus.




Foto 30 – *Leandra camporum* Brade – Holotypus.




Foto 31 – *Leandra camporum* Brade – Holotypus.




Foto 32 – *Leandra navicularis* Brade – Holotypus.





Foto 33 - *Leandra neglecta* Brade - Holotypus.

Foto 34 – *Leandra opaca* Brade – Holotypus.






Foto 35 – *Leandra planifilamentosa* Brade – Holotypus.

Foto 36 - *Leandra ramboi* Brade - Holotypus.

Foto 37 – *Miconia ramboi* Brade – Holotypus.




Foto 38 – *Miconia ramboi* Brade – Paratypus.


Foto 39 - *Ossaea flaccida* Brade - Isotypus.



Foto 40 – *Ossaea riograndensis* Brade – Holotypus.




Foto 41 – *Ossaea riograndensis* Brade – Paratypus.






Foto 42 - *Ossaea riograndensis* Brade - Paratypus.

Foto 43 - *Calyptrogenia hatschbachii* Legr. - Isotipus.

Foto 44 - *Stipa rhizomata* A. Zanin & Longhi-Wagner - Paratypus.