

# BRIOFLORA DA ILHA DE FERNANDO DE NORONHA, BRASIL

Carla Gomes Pereira<sup>1</sup>  
Paulo Eduardo A. S. Câmara<sup>2</sup>

Recebido em 05.03.2015, Aceito em 28.04.2015

## Abstract

The archipelago of Fernando de Noronha consists of a group of 21 oceanic islands of volcanic origin, located at a distance of 350 km from Natal, RN and 545 km from Recife, PE. The group of islands has a total area of 26 km<sup>2</sup> and the main island, Fernando de Noronha, has approximately 18,4 km<sup>2</sup>. Even though several studies on the vegetation of the islands exist, only two are related to bryophytes. One realized in 1891 and another one hundred years later. For this new inventory of bryophytes of Fernando de Noronha, there was realized a visit to the herbarium SP, where 116 vouchers were examined, and two expeditions to the archipelago in 2013 and 2014, with 475 new samples collected. We identified 28 species of bryophytes: two from the Anthocerothophyta Division (Notothyladaceae); three from the Marchantiophyta Division, with three different families; and 23 species of the Bryophyta Division, distributed in eight families, being the Fissidentaceae, with 12 species, the most diverse. Eleven species are new records for the island. Five species previously identified, were not found either in the herbarium or the field. *Riccia ridleyi* A. Gepp, endangered (category CR = Critically Endangered), was found.

**Key words:** Oceanic islands, inventory, *Riccia ridleyi*.

## Resumo

O arquipélago Fernando de Noronha é constituído por um grupo de 21 ilhas oceânicas, de natureza vulcânica, localizado a uma distância de 350 km de Natal, RN e 545 km de Recife, PE. O conjunto de ilhas ocupa uma área total de 26 km<sup>2</sup> e a principal ilha, Fernando de Noronha, tem aproximadamente 18,4 km<sup>2</sup>. Embora existam vários estudos relacionados à vegetação das ilhas, apenas dois são relacionados à brioflora. Um realizado em 1891, e outro, cem anos depois. Para este novo inventário da brioflora da ilha de Fernando de Noronha, foi realizada uma visita ao Herbário SP, onde 116 exsicatas foram analisadas, e duas expedições ao arquipélago em 2013 e 2014, resultando em 475 novas amostras foram coletadas. Foram identificadas 28 espécies de briófitas: sendo duas da Divisão Anthocerothophyta (Notothyladaceae); três da Divisão Marchantiophyta, divididas em três famílias e 23 espécies da Divisão Bryophyta, distribuídas em oito famílias, sendo a família Fissidentaceae, com 12 espécies, a mais diversa. Onze espécies são novas citações para a ilha. Cinco espécies anteriormente identificadas, não foram encontradas nem em herbário nem em

<sup>1</sup> Mestre em Botânica, Instituto de Ciências Biológicas – UnB, Departamento de Botânica, Brasília, DF. carla\_ghomes@yahoo.com.br.

<sup>2</sup> Doutor em Botânica, Instituto de Ciências Biológicas – UnB, Departamento de Botânica, Brasília, DF.

campo. *Riccia ridleyi* A. Gepp, ameaçada de extinção (categoria CR = Criticamente em Perigo), foi encontrada.

**Palavras chaves:** Ilhas oceânicas, inventário, *Riccia ridleyi*.

## Introdução

O arquipélago de Fernando de Noronha é um conjunto de ilhas oceânicas brasileiras situadas no oceano Atlântico Sul equatorial, pertencente ao estado de Pernambuco, localizado a 3°51'S e 32°25' W, a uma distância de 350 km de Natal, Rio Grande do Norte e 545 km de Recife, Pernambuco (Almeida *et al.*, 2002; Castro, 2009). Constitui um grupo de 21 ilhas, ilhotas ou rochedos e lajedos, de natureza vulcânica (Almeida, 1955) (Fig. 1), sua área total é de 26 km<sup>2</sup>, com altitude de 4.000 metros a partir do fundo do mar. A maior e principal ilha, Fernando de Noronha, tem aproximadamente 18,4 km<sup>2</sup> (Almeida *et al.*, 2002; Castro, 2009). O ponto mais alto do arquipélago é chamado de “Morro do Pico” com 321 metros de altitude acima do nível do mar (Almeida, 1955).

O primeiro a visitar e relatar o arquipélago foi Américo Vespúcio no ano de 1503, por meio da quarta expedição exploratória ao litoral brasileiro comandada por Gonçalo Coelho. Acidentalmente um dos seis navios naufragou e a tripulação utilizou a ilha para abrigo e reabastecimento (Gepp, 1891; Markham, 2005). Em seus relatos, Américo Vespúcio descreve a vegetação da ilha como “um boníssimo porto”, com “numerosas árvores infinitas” e água doce. Em 1832, na expedição do “HMS Beagle”, Charles Darwin visitou a ilha, promoveu as primeiras coletas botânicas e mencionou que ela era coberta por árvores. Contudo, na expedição organizada pela equipe de Ridley (1890), coletas e descrições científicas da vegetação foram registradas, relatando que na ilha havia o predomínio de vegetação herbácea, pois as árvores de grande porte eram cortadas para evitar a construção de jangadas que facilitariam fugas de presos.

A ocupação humana definitiva iniciou-se em 1737, quando Portugal transformou Fernando de Noronha em colônia correcional de presos comuns até 1938; nesse período a ilha passou por intensa transformação antrópica (Teixeira *et al.*, 2003). De 1938 até 1987 a ilha esteve sob administração militar, funcionando como presídio político da União e como posto avançado de defesa durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1988, o arquipélago foi reintegrado ao Estado de Pernambuco e com o crescimento populacional, o potencial ambiental do arquipélago foi reconhecido (Teixeira *et al.*, 2003; Mitraud, 2001). Foram criadas duas Unidades de Conservação Federais. A primeira foi instituída em 1986, denominada Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha (APA-FN) e a segunda, em 1988, denominada Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha (PARNAMAR-FN) (Silva Júnior, 2003).

O clima é tropical, do tipo Aw do sistema de classificação Köppen (Köppen, 1918), com temperatura anual média de 26,5°C (Abdala, 2008). A pluviosidade anual tem uma média de 1350 mm por ano. Essas precipitações estão distribuídas em duas estações anuais bem definidas, uma estação

chuvosa no período de março a maio e uma estação seca no período de agosto a janeiro (Montenegro *et al.*, 2009).

A rede hídrica da ilha de Fernando de Noronha é abastecida, prioritariamente, por fontes artificiais formadas por sistemas de produção de água potável. O principal sistema é o dessalinizador marinho, depois o manancial açude do Xaréu e placas de captação de água pluvial e, com menor capacidade, o sistema de poços tubulares (Tavares *et al.*, 2009).

A flora fanerogâmica do arquipélago, incluindo as exóticas, é composta por cerca de 450 espécies (Batistella, 1993). Segundo Pessenda *et al.*, (2005), numerosas espécies foram introduzidas nos últimos 400 anos, resultando na modificação do ecossistema terrestre original.

De acordo com Abdala (2008) três espécies representantes da flora de Fernando de Noronha são endêmicas, *Combretum rupicola* Ridl. (Combretaceae), *Ficus noronhae* Oliv. (Moraceae) e *Cereus insularis* Hemsl. (Cactaceae). Também são registrados endemismos de espécies de animais, como peixes, aves e lagartos. De forma geral, a vegetação da ilha é caracterizada por Mata Seca e vestígios de Mata Atlântica insular, onde se encontra o único manguezal insular do Atlântico Sul, o Mangue do Sueste (ICMBio, 2013). A flora de Fernando de Noronha tem sido considerada semelhante à caatinga, com predomínio de plantas espinhosas e cactos de 2 a 5 m de altura (Vital *et al.*, 1991), presença de gramíneas, de espécies arbustivas de pequeno porte, bem como de áreas florestais alteradas (Gouveia *et al.*, 2005).

O grupo das Briófitas, no sentido amplo, é composto pelas divisões Anthocerothophyta (Antóceros), Marchantiophyta (Hepáticas) e Bryophyta (Musgos) (Goffinet *et al.*, 2009). São plantas de pequeno porte, avasculares e morfológicamente simples na escala evolutiva. Apresentam como característica singular o gametófito dominante e de vida livre. É um grupo bastante diverso, com cerca de 25 mil espécies, podendo habitar os mais diversos ambientes (Costa *et al.*, 2010) Por formar tapetes, as briófitas servem como substrato para o desenvolvimento de cianobactérias, algas, fungos, animais e outras plantas (Fernández & Serrano, 2009; Gradstein *et al.*, 2001). Apresentam propriedades medicinais, valor cultural e econômico (Fernández & Serrano, 2009).

O primeiro levantamento da brioflora do Arquipélago de Fernando de Noronha foi realizado por Gepp (1891). Em sua pesquisa foi citada uma espécie, *Calymperes palisotii* Schwägr., dois gêneros de musgos, *Tortula* Hedw. e *Hypnum* Hedw., e apenas uma espécie de hepática (nova para a ciência), *Riccia ridleyi* A. Gepp.

O segundo levantamento foi realizado cem anos depois por Vital *et al.*, (1991), com 22 táxons listados, sendo dois de antóceros: *Notothylas breutellii* (Gottsche) Gottschee e *Notothylas vitalii* Udar & D. K. Singh; três de hepáticas: *Frullania ericoides* (Nees) Mont, *Lejeunea laetevirens* Nees & Mont., *Riccia* L.; e dezessete táxons de musgos: *Bryum coronatum* Schwägr., *Pohlia* Hedw., *Calymperes palisotii*, *Fissidens bryoides* Hedw., *F. elegans* Brid., *F. hornschurchii* Mont., *F. submarginatus* Bruch, *F. microcladus* var. *pussillissimus* (Steere) R. A. Pursell, *F. palmatus* Hedw., *F. goyazensis* Broth, *F. zollingeri*

Mont., *Octoblepharum albidum* Hedw., *Hyophiladelphus agrarius* (Hedw.) R. H. Zander., *Plaubelia sprengelii* (Schwägr.) R. H. Zander, *Splachnobryum obtusum* (Brid.) Müll. Hal. e *Entodontopsis leucostega* (Brid.) W. R. Buck & Ireland. *Tortula* Hedw. e *Hypnum* Hedw. não foram citados no segundo levantamento.

Esse trabalho tem como objetivo realizar um novo inventário da brioflora da Ilha de Fernando de Noronha, com chaves, ilustrações e comentários, bem como verificar se as espécies encontradas por Vital *et al.* (1991) ainda permanecem na ilha 35 anos após a última coleta. Com isso, contribuir para o monitoramento e preservação da brioflora após a criação das Unidades de Conservação Ambiental (UC) de Fernando de Noronha.

## Material e métodos

Foi feita uma visita ao herbário do Instituto de Botânica de São Paulo (SP) em setembro de 2013 onde foram analisadas 115 exsiccatas de briófitas de Fernando de Noronha, coletadas por Daniel Vital em 1978 (39 amostras feitas em seis dias), e também as coletas de Olga Yano & Denise Pinheiro da Costa, feitas em 1989 (76 amostras feitas em 20 dias). Todas as amostras foram analisadas e reidentificadas, observando-se as informações contidas nos envelopes. A partir disso, delimitaram-se as áreas de coletas na tentativa de reproduzir o máximo possível as mesmas rotas das coletas anteriores, bem como explorar as áreas que ainda não haviam sido coletadas.

Foram então realizadas duas expedições à ilha, com duração média de nove dias cada, a primeira em novembro de 2013, período de seca, com 180 amostras coletadas, e a segunda em maio de 2014, período de chuvas, onde 295 amostras foram coletadas. No total foram coletadas 475 amostras nas duas expedições (Tab. 1), em aproximadamente 70 pontos de coleta (Fig. 1).

As briófitas foram coletadas segundo a metodologia de Yano (1984). Ou seja, coletadas manualmente, juntamente com parte do substrato ou com o auxílio de um canivete ou espátula e acondicionadas em sacos de papel pardo devidamente identificado com dados referentes ao local, data, tipo de substrato e ecossistema. As identificações das plantas foram feitas através de literatura especializada e depois depositadas no herbário da Universidade de Brasília (UB).

Os sistemas de classificação adotados para as identificações das plantas foram baseados em Renzaglia & Vaughn (2009) para antóceros, Crandall-Stotler *et al.* (2009) para hepáticas e Goffinet *et al.* (2009) para musgos. A distribuição geográfica foi baseada em Costa *et al.* (2011) e na Lista de Espécies da Flora do Brasil (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>).

Para o tratamento taxonômico foi utilizado microscópio estereoscópico (lupa), marca: Nikon, modelo: SMZ445, nos aumentos de 0,8 a 3,5 vezes; microscópio óptico marca: Nikon, modelo: Eclipse E200, nos aumentos de 4, 10 e 40 vezes, e chaves de identificação. Os aspectos gerais de cada amostra foram analisados a partir da reidratação e montagem em lâminas semi-permanentes com solução de Hoyer (Anderson, 1954). Duplicatas foram enviadas ao herbário do Instituto de Botânica de São Paulo (SP).

Os critérios utilizados para definir a raridade de uma espécie foram adotados com base na frequência de ocorrência das espécies (Schumacker, 1985) em cada ponto de coleta. Segundo (Virtanen, 2014) as frequências de ocorrência local e global de briófitas não são necessariamente similares, visto que os fatores que determinam a dinâmica de distribuição estão ligados ao grau de limitação de dispersão. Com isso, considerando que o Arquipélago é isolado geograficamente, optou-se por denominar como espécie rara aquelas que foram encontradas em apenas um ou dois pontos de coleta na Ilha de Fernando de Noronha.

**Tabela 1:** Síntese das expedições realizadas em Fernando de Noronha, seus respectivos coletores, período de coletas e número de coletas.

	DATA	COLETOR	PERÍODO	COLETAS	TOTAL
VISITA AO HERBÁRIO SP SETEMBRO DE 2013	JULHO DE 1978	DANIEL VITAL	6 DIAS	39 AMOSTRAS	115 EXSICATAS ANALISADAS
	NOVEMBRO DE 1989	OLGA E DENISE	20 DIAS	76 AMOSTRAS	
PRIMEIRA EXPEDIÇÃO	NOVEMBRO DE 2013 (SECA)	CARLA, MICHELINE E PAULO	8 DIAS	180 AMOSTRAS	475 AMOSTRAS COLETADAS
SEGUNDA EXPEDIÇÃO	MAIO DE 2014 (CHUVOSA)	CARLA E NÍVEA	9 DIAS	295 AMOSTRAS	
					590

## Resultados

Um total de 590 exsicatas foi analisado. Deste, 115 amostras estavam depositadas no Instituto de Botânica de São Paulo (SP) e 475 amostras foram coletadas durante as expedições de 2013 e 2014. Foram identificadas 28 espécies de briófitas, sendo que duas são da Divisão Anthocerothophyta, representada pela família Notothyladaceae; três são de Marchantiophyta, representadas pelas famílias Frullaniaceae, Lejeuneaceae e Ricciaceae e 23 espécies são de Bryophyta, distribuídas em oito famílias (Tab. 2). A família mais representativa dentre os musgos foi a Fissidentaceae, com 11 espécies. As espécies com o maior número de ocorrências na ilha são *Calymperes*

*palisotii* Schwägr. e *Entodontopsis leucostega* (Brid.) Buck & Ireland, o único musgo pleurocárpico registrado.

Onze espécies são novas citações para a ilha (*Bryum atenense* R.S. Williams, *Fissidens angustifolius* Sull., *F. crispus* Mont., *F. curvatus* Hornsch., *F. flaccidus* Mitt., *F. lagenarius* Mitt., *F. lindbergii* Mitt., *Gemmabryum apiculatum* (Schwägr.) J.R. Spence & H.P. Ramsay, *G. subapiculatum* (Hampe) J.R. Spence & H.P. Ramsay, *Notothylas orbicularis* (Schwein.) Sull. e *Philonotis cernua* (Wilson) D.G. Griffin & W.R. Buck. Outros cinco táxons, anteriormente citados por Vital *et al.* (1991), não foram encontrados no herbário SP e nem nas novas coletas de 2013 e 2014. São eles: *Fissidens elegans*, *F. microcladus* var. *pussillissimus*, *Notothylas vitalii*, *Octoblepharum albidum* e *Pohlia* sp.

Além disso, seis espécies foram consideradas raras, ou seja, com uma ou duas ocorrências em pontos distintos, como é caso de *Bryum atenense*, *Dicranella varia*, *Fissidens curvatus*, *F. lagenarius*, *F. submarginatus* e *Philonotis cernua*.

**Tabela 2:** Representatividade das famílias e suas respectivas espécies identificadas. \* Espécies com nova citação para Ilha de Fernando de Noronha.

	FAMÍLIA	ESPÉCIES
ANTHOCEROTOPHYTA	NOTOTHYLADACEAE	<i>NOTOTHYLAS BREUTELII</i> (GOTTSCHKE) GOTTSCHKE <i>NOTOTHYLAS ORBICULARIS</i> (SCHWEIN.) SULL.*
	JUBULACEAE	<i>FRULLANIA ERICOIDES</i> (NEES EX MART.) MONT.
MARCHANTIOPHYTA	LEJEUNEACEAE	<i>LEJEUNEA LAETEVIRENS</i> NEES & MONT.
	RICCIACEAE	<i>RICCIA RIDLEYI</i> A. GEPP
	BARTRAMIACEAE	<i>PHILONOTIS CERNUA</i> (WILSON) D.G. GRIFFIN & W.R. BUCK*
BRYOPHYTA	BRYACEAE	<i>BRYUM ATENENSE</i> R.S. WILLIAMS* <i>BRYUM CORONATUM</i> SCHWÄGR. <i>GEMMABRYUM APICULATUM</i> (SCHWÄGR.) J.R. SPENCE & H.P. RAMSAY* <i>GEMMABRYUM SUBAPICULATUM</i> (HAMPE) J.R. SPENCE & H.P. RAMSAY*
	CALYMPERACEAE	<i>CALYMPERES PALISOTII</i> SCHWÄGR.
	DICRANACEAE	<i>DICRANELLA VARIA</i> (HEDW.) SCHIMP.

FISSIDENTACEAE	<i>FISSIDENS ANGUSTIFOLIUS</i> SULL.* <i>FISSIDENS BRYOIDES</i> HEDW. <i>FISSIDENS CRISPUS</i> MONT.* <i>FISSIDENS CURVATUS</i> HORNSCH.* <i>FISSIDENS FLACCIDUS</i> MITT.* <i>FISSIDENS GOYAZENSIS</i> BROTH. <i>FISSIDENS HORNSCHUCHII</i> MONT. <i>FISSIDENS LAGENARIUS</i> MITT.* <i>FISSIDENS LINDBERGII</i> MITT.* <i>FISSIDENS PALMATUS</i> HEDW. <i>FISSIDENS SUBMARGINATUS</i> BRUCH <i>FISSIDENS ZOLLINGERI</i> MONT.
POTTIACEAE	<i>HYOPHILADELPHUS AGRARIUS</i> (HEDW.) R.H. ZANDER <i>PLAUBELIA SPRENGELII</i> (SCHWÄGR.) R.H. ZANDER
SPLACHNOBRYACEAE	<i>SPLACHNOBRYUM OBTUSUM</i> (BRID.) MÜLL. HAL.
STEREOPHYLLACEAE	<i>ENTODONTOPSIS LEUCOSTEGA</i> (BRID.) BUCK & IRELAND

### Chave artificial para espécies de Anthocerotophyta

1. Esporos marrons a pretos, presença de pseudoelatórios.....  
.....***Notothyas breutelii***
1. Esporos amarelados, ausência de pseudoelatórios.... ***Notothyas orbicularis***

### Notothyadaceae

***Notothyas breutelii*** (Gottsche) Gottsche, *Bot. Zeitung (Berlin)* 16(15): 21. 1858.

Gametófito taloso, de cor verde escura, formando rosetas prostradas ao substrato. Cápsula abrindo por duas valvas; columela desenvolvida; esporos de cor marrom a preto; pseudoelatórios pequenos e globosos.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Morro do Pico, 31/VII/1978, em rochas cobertas com uma fina camada de solo, sob uma vegetação baixa, *D.M. Vital* 8321 (SP133192); Forte dos Remédios, 03/VIII/1978, solo úmido, à sombra, *D.M. Vital* 8341 (SP133199); Morro de Farol, 03/VIII/1978, solo úmido na mata secundária, *D.M. Vital* 8335 (SP133197).

Distribuição geográfica: América tropical. No Brasil: BA, ES, MA, MS, PE, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: *Notothyas breutelii* foi identificada como *N. vitali* por Vital *et al.* (1991), que tem como características esporos amarelados e presença de elatórios. No entanto, os exemplares existentes no herbário SP e identificados como tal, demonstram esporos de cor marrom a pretos e pseudoelatórios, que são características de *N. breutelii*. Espécie encontrada em solos de áreas abertas, pouco sombreadas e úmidas. Amostras frequentemente encontradas associadas a *Fissidens bryoides* e *F. lindbergii*. Nas expedições de 2013 e 2014 foram coletadas várias amostras de *Notothyas* sp., porém sem estruturas de reprodução, o que impossibilitou a confirmação da espécie.

***Notothylas orbicularis* (Schwein.) Sull., Amer. J. Sci. Arts, 51: 75. 1846.**

Gametófito taloso, de cor verde escura, formando rosetas prostradas ao substrato. Cápsula abrindo por um opérculo; ausência de columela; esporos de cor amarelada; ausência de pseudoelatórios.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Alto Dois Abraços, 31/VII/1978, em solo úmido ao longo da estrada, *D.M. Vital* 8326 (SP133194).

Distribuição geográfica: América do Norte, Europa, Japão e África. No Brasil: AM, CE, PE e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Nova citação para Fernando de Noronha. As plantas analisadas foram encontradas, em solos úmidos, associadas a *Fissidens bryoides* e *F. lindbergii*. Os esporófitos de *Notothylas orbicularis* apresentam tamanhos menores que *N. breutelii*.

**Chave artificial para espécies de Marchantiophyta**

1. Gametófito taloso..... ***Riccia ridleyi***
1. Gametófito folhoso..... 2
  2. Gametófito verde escuro a marrom avermelhado; lóbulo sacado; trigônios presentes ..... ***Frullania ericoides***
  2. Gametófito verde claro a amarelado; lóbulo não sacado, trigônios ausentes ..... ***Lejeunea laetevirens***

**Frullaniaceae**

***Frullania ericoides* (Nees) Mont., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 12: 51.1839.**

Gametófito folhoso, cor verde escuro a vermelho-amarronzado, com ramificações irregulares; anfigastro bifido; células do filídio arredondadas a alongadas, com paredes formando trigônios; lóbulo sacado com abertura voltada para a base do caulídio. Esporófito não visualizado. Segundo Gradstein & Costa (2003) apresenta perianto curto, cápsula globosa, perianto quilhado e verrucoso.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Morro do Pico, 31/VII/1978, rochas nuas, quase no topo do morro, *D.M. Vital* 8313 (SP133187); Alto Dois Abraços, 02/VIII/1978, tronco vivo, na mata secundária, próximo ao morro, *D.M. Vital* 8334 (SP133196); Capim Açú (Sapata), 04/XI/2013, tronco vivo, 159 m alt., *Pereira et al.* 136 (UB169841); Morro do Francês, 06/XI/2013, rocha ao longo da estrada, 195 m alt., *Pereira et al.* 193 (UB169899).

Distribuição geográfica: África, Austrália, América do Norte, América do Sul, Ásia. No Brasil: AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, RJ, RR, RS, SC, SE, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: *Frullania ericoides* foi encontrada tanto no período seco quanto no chuvoso. Planta facilmente distinguível de *Lejeunea laetevirens*, por sua tonalidade mais escura, principalmente nos indivíduos mais antigos. Os

filídios escuras também são outra característica bastante comum nesta espécie. Os lóbulos podem aparecer mais abertos, não sacados.

### Lejeuneaceae

***Lejeunea laetevirens* Nees & Mont., Hist. Phys. Cuba, Bot., Pl. Cell, 469. 1842.**

Gametófito folhoso, de cor verde clara a amarelada. Caulídio de coloração na mesma tonalidade que os filídios e mede de 3-4 células de largura; anfigastro bifido, merófito formado por duas células. Células do filídio isodiamétricas, trigônios ausentes, ápice cuculado a obtuso; lóbulos não sacados de aparência inflada. Esporófito não visualizado. Segundo Gradstein & Costa (2003) apresenta perianto quilhado.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Morro do Pico, 31/VII/1978, grandes rochas na base do morro, *D.M. Vital* 8311 (SP133186); Alto Dois Abraços, 02/VIII/1978, tronco vivo, na mata secundária, *D.M. Vital* 8333 (SP133195); Morro da Madeira, 17/XI/1989, rocha exposta, de frente para ilha Cabeluda, *D.P. Costa & O. Yano* 1024 (SP228595); Morro do Piquinho, 01/XI/2013, rocha, 147 m alt., *Pereira et al.* 52 (UB169760); Capim Açú (Sapata), 04/XI/2013, tronco vivo, 159 m alt., *Pereira et al.* 114 (UB169818).

Distribuição geográfica: América do Norte, América do Sul, Ásia. No Brasil: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, RJ, RN, RR, RS, SC, SE, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Hepática bem distribuída na mata do Capim Açú (Ponta da Sapata) e no Morro do Piquinho. Espécie xero-tolerante (Gradstein & Costa, 2003), pode ser encontrada tanto na época seca quanto na chuvosa, cobrindo grandes paredes de rochas, de hábito frequentemente epífita, hospedada em troncos vivos e rochas. Algumas amostras foram encontradas associadas a *Calymperes palisotii* e *Frullania ericoides*. Os lóbulos apresentam 1-2 dentes (uma célula de cada lado) e papila hialina, algumas vezes ausente. Na ilha, foram encontradas apenas duas hepáticas folhosas. *Lejeunea laetevirens* pode ser facilmente distinguida de *F. ericoides*, por sua cor verde claro e por apresentar lóbulos não sacados.

### Ricciaceae

***Riccia ridleyi* A. Gepp, J. Linn. Soc., Bot., 27: 74. 1890.**

Hepática talosa, talo sulcado na região mediana e às vezes bifurcado. Células diferenciadas (escamas) de cor violeta na margem dos talos. Esporófitos não visualizados. Segundo Gradstein & Costa (2003) apresenta esporófito embutido no talo, cápsula globosa, sem pé e nem seta.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Morro do Pico, 31/VII/1978, rochas no topo do morro, *D.M. Vital* 8314 (SP133188); Alto da Bandeira, 04/VIII/1978, solo, na mata rala, já na descida do morro, *D.M. Vital* 8347 (SP133200); Praia do Americano, 04/V/2014, solo ao longo da trilha, 32 m alt., *Pereira et al.* 219 (UB174407); Idem, 04/V/2014, solo entre rochas,

na formação rochosa de frente para a praia, 52 m alt., *Pereira et al.* 241 (UB174429); Trilha grande do Atalaia, 08/V/2014, solo entre rochas, 62 m alt., *Pereira et al.* 380 (UB174568); Primeiro Mirante da Sapata, 09/V/2014, solo, 32 m alt., *Pereira et al.* 451 (UB174639); Base do Morro do Abreu, 09/V/2014, solo, 38 m alt., *Pereira et al.* 464 (UB174653); Segundo Mirante para Baía dos Golfinhos, 10/V/2014, solo, 64 m alt., *Pereira et al.* 481 (UB174569); Mirante para Praia do Sancho, 10/V/2014, solo entre rochas, 61 m alt., *Pereira et al.* 497 (UB174677).

Distribuição geográfica: América do Sul (Venezuela e Peru). No Brasil: Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: *Riccia ridleyi* é considerada uma espécie rara para o Brasil, com ocorrência apenas para Fernando de Noronha, Venezuela e Peru. Está na lista de flora brasileira ameaçada de extinção na categoria CR (Criticamente em Perigo), critérios B2ab (i, ii, iii) (CNCflora, 2015). Durante a segunda expedição, na estação chuvosa, essa espécie foi encontrada formando populações em vários pontos da ilha.

### Chave artificial para espécies de Bryophyta

1. Plantas pleurocárpicas ..... ***Entodontopsis leucostega***
1. Plantas acrocárpicas ..... 2
  2. Filídios em disposição dística, presença de lâmina vaginante ..... 3
  2. Filídios em disposição radial, ausência de lâmina vaginante ..... 14
3. Limbídio apenas na lâmina vaginante ..... 4
3. Limbídio em todo o filídio ..... 6
  4. Limbídio apenas na lâmina vaginante de todos os filídios ..... ***Fissidens submarginatus***
  4. Limbídio apenas na lâmina vaginante da maioria dos filídios ..... 5
5. Células da lâmina do filídio quadráticas a pentagonais, célula apical hialina presente ..... ***Fissidens hornschuchii***
5. Células da lâmina do filídio arredondadas e irregulares, célula apical hialina ausente ..... ***Fissidens lagenarius***
  6. Células da lâmina do filídio lisas ..... 7
  6. Células da lâmina do filídio unipapilosas ..... 12
7. Gametófitos flabelados, mais largos do que longos ..... 8
7. Gametófitos não flabelados, mais longos do que largos ..... 10
  8. Células da lâmina do filídio curto-retangulares a arredondadas, nódulos axilares presentes no caulídio ..... ***Fissidens zollingeri***
  8. Células da lâmina do filídio romboidais a retangulares ou irregulares, nódulos axilares ausentes ..... 9

9. Células da lâmina do filídio com paredes sinuosas, células da região mediana não diferenciadas e dispostas em fileiras paralelas com relação à costa .....  
..... ***Fissidens flaccidus***
9. Células da lâmina do filídio com paredes não sinuosas, células da região mediana diferenciadas e dispostas em diagonal com relação à costa .....  
..... ***Fissidens palmatus***
10. Limbídio biestratoso, filídios linear-lanceolados a oblongo-anceolados .....  
..... ***Fissidens curvatus***
10. Limbídio uniestratoso, filídios oblongos a oblongo-ovalados ..... 11
11. Nódulos axilares hialinos presentes, células dos filídios organizadas em fileiras distintas ..... ***Fissidens crispus***
11. Nódulos axilares hialinos ausentes, células dos filídios não organizadas em fileiras distintas ..... ***Fissidens bryoides***
12. Células do filídio hexagonais a romboidais, com paredes sinuosas, costa subpercurrente (finalizando 11-18 células abaixo do ápice .....  
..... ***Fissidens lindbergii***
12. Células do filídio curto-hexagonais, quadráticas ou arredondadas, sem paredes sinuosas, costa percurrente ou curto-excurrente ..... 13
13. Células justacostais longo retangulares na base da lâmina vaginante .....  
..... ***Fissidens angustifolius***
13. Células justacostais curto retangulares a quadráticas na base da lâmina vaginante ..... ***Fissidens goyazensis***
14. Costa larga, com 6-10 células de largura, células da região basal hialinas ..... 15
14. Costa estreita, com 2-6 células de largura, células da região basal não hialinas ..... 17
15. Base dos filídios com células hialinas distinguindo-se de forma abrupta das células clorofiladas, presença de teníolas ..... ***Calymperes palisotii***
15. Base dos filídios com células hialinas distinguindo-se de forma gradual das células clorofiladas ou não diferenciadas, ausência de teníolas ..... 16
16. Costa coberta por células retangulares na superfície ventral, ausência de células mamilosas no ápice do filídio ..... ***Hyophiladelphus agrarius***
16. Costa coberta por células quadradas a arredondadas na superfície ventral, presença de células mamilosas no ápice do filídio .....  
..... ***Plaubelia sprengelii***
17. Filídios com margem distinta, células da borda da região mediana superior diferenciadas a pouco diferenciadas ..... 18
17. Filídios sem margem distinta, células da borda do ápice pouco diferenciadas ..... 21
18. Ápice dos filídios apiculado e células da base arredondadas .....  
..... ***Gemmabryum apiculatum***

18. Ápice dos filídios acuminados e células da base quadráticas a curto retangulares..... 19
19. Margem dos filídios inteira na porção mediana superior..... ***Bryum atenense***
19. Margem dos filídios levemente denteada na porção mediana superior..... 20
20. Caulídios levemente avermelhados na base, costa estreita, com 2-4 células de largura, filídios agrupados no ápice do caulídio.....  
..... ***Bryum coronatum***
20. Caulídios esverdeados, costa forte, com 4-6 células de largura, filídios não agrupados no ápice do caulídio..... ***Gemmabryum subapiculatum***
21. Filídios oblongos a ligulados, com margem lisa a levemente crenulada no ápice ..... ***Splachnobryum obtusum***
21. Filídios lanceolados, estreitamente ovalado-lanceolados a linear-lanceolados, com margem serrulada na região mediana superior ..... 22
22. Filídios estreitamente ovalado-lanceolados, células da região mediana superior do filídio mamilosas ..... ***Philonotis cernua***
22. Filídios estreitamente lanceolados a linear-lanceolados, células da região mediana superior do filídio proradas ..... ***Dicranella varia***

### Bartramiaceae

***Philonotis cernua*** (Wilson) D.G. Griffin & W.R. Buck, *Bryologist* 92(3): 376. 1989.

Gametófitos verde-amarelados; filídios em disposição radial, lanceolados a estreitamente ovalado-lanceolados; ápice acuminado; costa estreita, com 2-6 células de largura, percurrente. Células da margem do filídio serrulada a partir da região mediana superior. Células da lâmina do filídio retangulares e mamilosas a partir da região mediana superior e células da região basal lisas. Esporófito não visualizado. Segundo Sharp *et al.* (1994), a espécie apresenta esporófito inclinado a reto, com cápsula globosa e peristômio ausente.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Vila dos Remédios, 05/VI/2013, solo entre rochas, próximo à Igreja dos Remédios, 49 m alt., *Pereira et al.* 273 (UB174461); Morro da Madeira, 17/XI/1989, rocha, *D.P. Costa & O. Yano* 1034 (SP228605).

Distribuição geográfica: África, América do Norte, América do Sul, Ásia. No Brasil: CE, DF, GO, MA, MG, MT, PB, PR, RJ, RS, SC, SE, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Nova citação para Fernando de Noronha, porém rara neste local, pois foi encontrada apenas na Vila dos Remédios e em pouca quantidade.

### Bryaceae

***Bryum atenense*** R.S. Williams, *Bull. New York Bot. Gard.* 6(21): 231. 1909.

Gametófitos verde-claros, caulídios curtos. Filídios em disposição radial, oblongos a oblongo-lanceolados; ápice acuminado formando aristas; costa

estreita, com 2-6 células de largura, longo-excurrente. Células da borda diferenciadas, formando margem com uma célula de largura, inteira na porção mediana superior. Células da lâmina do filídio lisas, células da região mediana hexagonais e células da região basal quadráticas a curto-retangulares. Esporófito não visualizado. Segundo Sharp *et al.* (1994), o gênero apresenta esporófito terminal, com cápsula piriforme e peristômio duplo.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Estrada velha do Sueste, indo para o Morro do Abreu, 09/V/2014, em solo, 43 m alt., *Pereira et al.* 453 (UB174642).

Distribuição geográfica: América do Sul (Bolívia). No Brasil: GO, MT, MS e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Nova citação para Fernando de Noronha, rara neste local, pois foi encontrada apenas nas proximidades do Morro do Abreu. Apresenta similaridade morfológica com *Gemmabryum subapiculatum*. *Bryum atenense* distingue-se principalmente por apresentar gametófito muito pequeno e delicado, além de apresentar filídios mais curtos e com células quadráticas a curto-retangulares na base dos filídios.

***Bryum coronatum* Schwägr., Spec. Musc. Frond., Suppl. 1(2): 103–104, pl. 71. 1816.**

Gametófitos verde-amarronzados, caulídios avermelhados na base. Filídios em disposição radial, agrupados no ápice do caulídio, oblongo-lanceolados a ovalados; ápice agudo; costa estreita, com 2-4 células de largura, excurrente. Células da borda diferenciadas, alongadas, formando margem com 1-2 células de largura, levemente denteada na porção mediana superior. Células da lâmina do filídio lisas, células da região mediana hexagonais a longo-hexagonais e células da região basal retangulares. Esporófito não visualizado. Segundo Sharp *et al.* (1994), a espécie apresenta esporófito terminal, longo com cápsula pêndula e peristômio duplo.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Morro do Piquinho, 01/XI/2013, solo, na base do morro, 147 m alt., *Pereira et al.* 63 (UB169770); Praça Flamboyant, 05/V/2014, solo, 93 m alt., *Pereira et al.* 250 (UB174438); Vila dos Remédios, 05/V/2014, cimento, nas ruínas do antigo presídio, ao lado do palácio São Miguel, 75 m alt., *Pereira et al.* 254 (UB174442); Cemitério, 07/V/2014, cimento entre a mureta, 98 m alt., *Pereira et al.* 339 (UB174528).

Distribuição geográfica: África, América Central, América do Norte, América do Sul, Ásia, Oceania. No Brasil: AC, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PI, PE, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Espécie encontrada em associação com *Gemmabryum apiculatum*, *G. subapiculatum* e *Splachnobryum obtusum*. Planta bastante similar a *Bryum atenense* por apresentar caulídios levemente avermelhados, principalmente nos exemplares coletados na estação seca e a *Gemmabryum subapiculatum* pelo comprimento e disposição dos filídios no gametófito. *B. atenense* difere de *B. coronatum* principalmente por apresentar o ápice do

filídio acuminado e difere de *G. subapiculatum* por apresentar células da região basal mais compridas, ou seja, longo-retangulares.

***Gemmabryum apiculatum* (Schwägr.) J.R. Spence & H.P. Ramsay.** *Phytologia* 87(2): 65. 2005.

Gametófitos verde-amarelados a avermelhados. Filídios em disposição radial, oblongos a oblongo-lanceolados, côncavos; ápice apiculado; costa estreita, com 2-6 células de largura, percurrente. Células da borda pouco diferenciadas, margem inteira em todo o filídio. Células da lâmina do filídio lisas, células da região mediana oblongo-romboidais e da região basal arredondadas a quadráticas. Esporófito não visualizado. Segundo Sharp *et al.* (1994), a espécie apresenta esporófito delgado, com cápsula horizontal e oblongo-piriforme e peristômio duplo.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Alojamento do ICMBio, 03/XI/2013, solo, 55 m alt., *Pereira et al.* 106 (UB169811); Sítio Leão (antigo viveiro de Mudanças do projeto Tamar), 05/XI/2013, solo, 51 m alt., *Pereira et al.* 161-A (UB169867); Morro do Piquinho, 06/VI/2014, solo entre rochas, na base do morro, 164 m alt., *Pereira et al.* 297 (UB174486); Praia do Leão, 07/VI/2014, solo entre rochas, de frente para a praia, 25 m alt., *Pereira et al.* 340 (UB174529); ICMBio, 08/VI/2014, solo, 55 m alt., *Pereira et al.* 353 (UB174541).

Distribuição geográfica: América do Sul e Austrália. No Brasil: AC, AM, BA, CE, DF, MA, MG, PA, PI, PB, PR, RJ, RN, RS, SC, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Nova citação para Fernando de Noronha, porém, segundo Sharp *et al.* (1994), essa espécie é facilmente confundida com outras espécies de *Bryum* e *Pohlia* por apresentar variações morfológicas como tamanho e cor, além de ápice acuminado e concavidade nos filídios. Mas uma das principais características que facilita a identificação é o fato dos caulídios serem avermelhados e os filídios amarelados.

***Gemmabryum subapiculatum* (Hampe) J.R. Spence & H.P. Ramsay,** *Phytologia* 87(2): 68. 2005.

Gametófitos verde-claros a verde-escuros, caulídios esverdeados, alongados. Filídios em disposição radial, oblongo-lanceolados; ápice agudo a levemente acuminado; costa forte, com 4-6 células de largura; longo-excurrente. Células da borda diferenciadas, alongadas, formando margem com 1-2 células de largura na região mediana do filídio e levemente denteada na porção mediana superior. Células da lâmina do filídio lisas, células da região mediana longo-hexagonais e da região basal retangulares a longo-retangulares. Esporófito não visualizado. Segundo Sharp *et al.* (1994), a espécie apresenta esporófito terminal, delgado com cápsula pêndula e alongada e peristômio duplo.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Vila dos Remédios, 31/XI/2013, solo, nas ruínas do antigo presídio, ao lado do palácio São Miguel, 54 m alt., *Pereira et al.* 29 (UB169744); Cacimba do Padre, 04/XI/2013, cimento, 21 m alt., *Pereira et al.* 156 (UB169861); Cemitério,

05/XI/2013, cimento de túmulo, 115 m alt., *Pereira et al.* 178 (UB169884); Praça Flamboyant, 05/V/2014, solo, 93 m alt., *Pereira et al.* 250 (UB174438); Mirante da Praia do Sancho, 10/V/2014, solo, 61 m alt., *Pereira et al.* 496 (UB174676).

Distribuição geográfica: América do Sul, América do Norte e Austrália. No Brasil: AM, BA, DF, GO, MA, MT, PA, PR, RJ, RO, RR, RS, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Nova citação para Fernando de Noronha, encontrada em muitos pontos de coleta e frequentemente associada a outras espécies, como *Fissidens lindbergii*, *Gemmabryum apiculatum*, *Plaubelia sprengelii* e *Splachnobryum obtusum*. Em alguns pontos, essa planta foi encontrada com gametófitos bastante longos.

Planta coletada principalmente em cimento em áreas abertas e algumas vezes em solo de áreas sombreadas.

### **Calymperaceae**

***Calymperes palisotii* Schwägr., Sp. Musc. Frond., Suppl. 1(2): 334. pl. 98. 1816.**

Gametófitos verde-amarelados a verde-escuros, espiralados quando secos. Filídios em disposição radial, oblongo a lanceolados; dimórficos, com o ápice em alguns dos filídios apresentando propágulos (gemas); costa larga, com 6-10 células de largura, percurrente. Células da margem (intramarginais) formando teníolas conspícuas; células da lâmina do filídio lisas e isodiamétricas; região basal do filídio formada em sua maioria por células cancelinas mais largas, hialinas e lisas, que se distinguem abruptamente das células clorofiladas. Esporófito não visualizado. Segundo Reese (1993), a espécie apresenta esporófito com seta longa, cápsula exserta e peristômio ausente.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Vila dos Remédios, 31/X/2013, tronco vivo, ao lado do palácio São Miguel, 54 m alt., *Pereira et al.* 14 (UB169731); Morro do Piquinho, 01/XI/2013, rocha, na base do morro, próximo à fenda, 147 m alt., *Pereira et al.* 69 (UB169776); Morro do Pico, 31/VII/1978, rocha, na base do morro, *D.M. Vital* 8312 (SP147363); Planície da Viração, 02/VIII/1978, rocha, próximo à mata, *D.M. Vital* 8337 (SP147376); Baía dos Golfinhos, 03/XI/2013, tronco vivo, na trilha para a Baía, 65 m alt., *Pereira et al.* 92 (UB169797); Mirante para a Praia do Sancho, 03/XI/2013, rocha, na trilha depois do mirante dos golfinhos, 64 m alt., *Pereira et al.* 102 (UB169807); Cacimba do Padre, 04/XI/2013, tronco vivo, 21 m alt., *Pereira et al.* 154 (UB169859); Morro do Francês, 06/XI/2013, rocha, na margem da estrada, 195 m alt., *Pereira et al.* 196 (UB169900); Estrada para a Praia do Bode, 04/V/2014, rocha, próximo à mata, 45 m alt., *Pereira et al.* 204 (UB174397); Praça Flamboyant, 05/V/2014, tronco morto, 93 m alt., *Pereira et al.* 246 (UB174434); Trilha para a Vila da Vacaria, 06/V/2014, rocha, 77 m alt., *Pereira et al.* 307 (UB17496); Morro da Madeira, 08/V/2014, tronco vivo, 74 m alt., *Pereira et al.* 373 (UB174561); Vila Quixaba, 09/V/2014, tronco vivo, 93 m alt., *Pereira et al.* 386 (UB174574); Capim Açu (Sapata), 09/V/2014, tronco

morto, 139 m alt., *Pereira et al.* 430 (UB174618); Farol da Sapata, 09/V/2014, tronco vivo, 185m alt., *Pereira et al.* 437 (UB174625); Ponta da Sapata, 20/XI/1989, tronco vivo, *D.P. Costa & O. Yano* 1051 (SP228622).

Distribuição no Brasil: AL, AM, AP, BA, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SE, SP, TO e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Espécie amplamente distribuída na ilha, encontrada em vários pontos e frequentemente sobre o tronco de árvores vivas ou mortas, raízes e também sobre rochas, com gametófitos dispersos sobre o substrato ou formando tufos densos. Encontrada associada a *Lejeunea laetevirens* e *Frullania ericoides*.

## Dicranaceae

***Dicranella varia* (Hedw.) Schimp., Coroll. Bryol. Eur. 13. 1856.**

Gametófitos verde-claros a verde-amarelados, levemente falcados quando secos. Filídios em disposição radial, estreitamente lanceolados a linear-lanceolados; ápice agudo; costa estreita, com 2-6 células de largura, percurrente. Células da margem levemente denticulada na região mediana superior; células da lâmina longo-retangulares e células da base oblongo-linear, células da região mediana superior do filídio proradas e da região basal lisas. Esporófito não visualizado. Segundo Sharp *et al.* (1994), a espécie apresenta esporófito alongado com cápsula levemente curvada e ovóide e peristômio simples.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Morro do Piquinho, 06/V/2013, solo entre rochas, na base do morro, próximo à caverna, 164 m alt., *Pereira et al.* 292 (UB174481).

Distribuição geográfica: África, América Central, América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa. No Brasil: CE, ES, GO, MT, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Espécie com nova citação para Fernando de Noronha, considerada rara, pois foi encontrada apenas nas proximidades do Morro do Piquinho. Planta com coleta registrada no mesmo local em 1978, 2013 e 2014. Apesar de *Dicranella varia* ainda ocorrer no mesmo local desde a primeira coleta, a área em que ela foi coletada, base do Morro do Piquinho, é muito pequena, cerca de 10 metros quadrados e é utilizada para atividades de ecoturismo.

## Fissidentaceae

***Fissidens angustifolius* Sull., Proc. Amer. Acad. Arts. 5: 275. 1861.**

Gametófitos flabelados, verde-amarelados; nódulos axilares hialinos presentes no caulídio. Filídios em disposição dística, lanceolados, limbídio confluyente com o ápice ou finalizando algumas células abaixo; costa percurrente. Células da lâmina do filídio unipapilosas, irregulares, curto-hexagonais na região mediana superior, células justacostais longo-retangulares na base da lâmina vaginante. Esporófito não visualizado. Segundo Bordin & Yano (2013), essa espécie apresenta esporófito terminal, cápsula cilíndrica e peristômio simples (do tipo scariosus).

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Vila dos Remédios, 31/VIII/1978, solo de barrancos próximo à estrada, *D.M. Vital* 8338 (SP147377); Praia do Americano, 04/V/2014, solo ao longo da trilha, formando um grande tapete, 32 m alt., *Pereira et al.* 218 (UB174406); Trilha para o Mirante dos Golfinhos, 04/V/2014, solo, próximo à estrada, no início da trilha, 52 m alt., *Pereira et al.* 236 (UB17424); Praia do Leão, 07/V/2014, solo entre rochas, de frente para o Morro do Leão, 25 m alt., *Pereira et al.* 340 (UB174529); Trilha grande do Atalaia, 08/V/2014, solo, 81 m alt., *Pereira et al.* 377 (UB174565); Capim Açú (Sapata), 09/V/2014, solo, no estacionamento do início da trilha, 176 m alt., *Pereira et al.* 407 (UB174595); Primeiro Mirante da Sapata, 09/V/2014, rocha, 32 m alt., *Pereira et al.* 448 (UB174636); Estrada velha do Sueste, indo para o Morro do Abreu, 09/V/2014, em solo, 43 m alt., *Pereira et al.* 453 (UB174642); Estrada velha do Sueste, indo para o Morro do Abreu, 09/V/2014, em solo, 43 m alt., *Pereira et al.* 460 (UB174649); Baía dos Golfinhos, 10/V/2014, em solo, 65 m alt., *Pereira et al.* 480 (UB174659); Mirante da Praia do Sancho, 10/V/2014, solo, 61 m alt., *Pereira et al.* 494 (UB174673).

Distribuição geográfica: África, América do Norte, América Central, América do Sul, Ásia. No Brasil: AC, AM, BA, CE, GO, MA, PA, PB, PE, PI, RJ, RO, RS, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Nova citação para Fernando de Noronha, encontrada formando tapetes, é muito similar a *Fissidens lindbergii* por apresentar gametófito flabelado, limbídio em toda a lâmina e células unipapilosas, porém, *F. lindbergii* tem células hexagonais, costa finalizando abaixo do ápice e, às vezes, apresentando tons avermelhados.

***Fissidens bryoides* Hedw., Sp. Musc. Frond. 153. 1801.**

Gametófitos não flabelados, verde-claros; nódulos axilares hialinos ausentes no caulídio. Filídios em disposição dística, oblongos a oblongo-ovalados, limbídio uniestratoso, finalizando 3-8 células abaixo do ápice e antes da base; costa percurrente. Células da lâmina do filídio lisas, curto-hexagonais, quadráticas a arredondadas, não organizadas em fileiras distintas. Esporófito não visualizado. Segundo Bordin & Yano (2013), essa espécie apresenta esporófito terminal, cápsula cilíndrica e peristômio simples (do tipo bryoides).

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Trilha para Mirante dos Golfinhos, 04/V/2014, solo entre rochas, próximo à estrada, na mata fechada, no início da trilha, 52 m alt., *Pereira et al.* 235 (UB174423); Vila dos Remédios, 05/V/2014, cimento ao lado do palácio São Miguel, 75 m alt., *Pereira et al.* 258 (UB174446); Forte dos Remédios, 03/VIII/1978, solo de barrancos úmidos à sombra, *D.M. Vital* 8341 (SP133199); Trilha para Vila da Vacaria, 06/V/2014, solo, 82 m alt., *Pereira et al.* 304 (UB17493); Capim Açú (Sapata), 04/VIII/1978, solo à sombra parcial, próximo à praia, *D.M. Vital* 8348 (SP147385); Morro do Pico, 31/VII/1978, solo sob vegetação baixa e rala, próximo à base do Pico, *D.M. Vital* 8347 (SP133200).

Distribuição geográfica: África, América do Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Europa, Oceania. No Brasil: PR, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Planta encontrada associada a *Riccia ridleyi* e a *Notothylas breutelii*, muito similar a *Fissidens crispus* pelo formato do filídio e das células. Podem ser diferenciadas pela ausência de nódulos axilares hialinos em *F. bryoides*.

***Fissidens crispus* Mont., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 9: 57. 1838.**

Gametófitos não flabelados, verde-claros; nódulos axilares hialinos presentes no caulídio. Filídios em disposição dística, oblongos a oblongo-ovalados, com limbídio confluyente ou finalizando 3-4 células abaixo do ápice; costa percurrente. Células da lâmina do filídio lisas, curto-hexagonais, quadráticas a arredondadas, organizadas em fileiras distintas. Esporófito não visualizado. Segundo Bordin & Yano (2013), essa espécie apresenta esporófito terminal, cápsula globosa e peristômio simples (do tipo bryoides).

Material examinado: BRASIL. PE: **Fernando de Noronha**, Baía dos Golfinhos, 03/XI/2013, solo, na trilha para o mirante, 65 m alt., *Pereira et al.* 86 (UB169791); Praia do Sancho, 03/XI/2013, solo, próximo à trilha para praia, 64 m alt., *Pereira et al.* 95 (UB169800); Capim Açú (Sapata), 04/XI/2013, solo, na trilha, 159 m alt., *Pereira et al.* 109 (UB169813); Estrada para a Praia do Bode, 04/V/2014, solo, próximo à mata, 45 m alt., *Pereira et al.* 206 (UB174394); Praia do Americano, 04/V/2014, solo ao longo da trilha, 32 m alt., *Pereira et al.* 221 (UB174409); Estrada velha do Sueste, indo para o Morro do Abreu, 09/V/2014, em solo, 43 m alt., *Pereira et al.* 452 (UB174641); Baía dos Golfinhos, 10/V/2014, em solo, próximo ao segundo mirante, 65 m alt., *Pereira et al.* 489 (UB174668).

Distribuição geográfica: África, América do Norte, América Central, América do Sul, Europa. No Brasil: AM, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MT, PE, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SP, TO e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Nova citação para Fernando de Noronha. Muito similar a *Fissidens bryoides*, diferindo por apresentar nódulos axilares no caulídio e por ter células menores na lâmina do filídio, seguindo uma organização vertical.

***Fissidens curvatus* Hornsch., Linnaea 15: 148. 1841.**

Gametófitos não flabelados, verde-claros a amarelados; nódulos axilares hialinos presentes no caulídio. Filídios em disposição dística, longos, linear-lanceolados a oblongo-lanceolados, quando secos têm forma curvada; limbídio em todo o filídio, confluyente com a costa, biestratoso (1-2 células de largura); costa percurrente de cor amarelada. Células da lamina do filídio lisas e com formas irregulares. Esporófito não visualizado. Segundo Bordin & Yano (2013), essa espécie apresenta esporófito terminal, cápsula ovóide e peristômio simples (do tipo bryoides).

Material examinado: BRASIL. PE: **Fernando de Noronha**, Capim Açú (Sapata), 20/XI/1989, sobre solo arenoso da mata, O. Yano & D.P. Costa 13631 (SP228522).

Distribuição geográfica: América Central, América do Norte, América do Sul. No Brasil: ES, MG, PR, RJ, RS, SC, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Nova citação para Fernando de Noronha, porém bastante rara no local. Foi coletada apenas uma única amostra em 1989 por Yano & Costa. Planta não encontrada durante as expedições de 2013 e 2014.

***Fissidens flaccidus* Mitt., Trans. Linn. Soc. London 23: 56. 1860.**

Gametófitos flabelados, verde-claros a amarelados; nódulos axilares hialinos ausentes no caulídio, gemas clavadas presentes ou ausentes no caulídio. Filídios em disposição dística, lanceolados, limbídio em todo o filídio, confluyente com o ápice; costa finalizando 3-15 células abaixo do ápice. Células da lâmina do filídio lisas e com paredes sinuosas, romboidais a retangulares; células da região mediana do filídio dispostas em fileiras paralelas com relação à costa. Esporófito não visualizado. Segundo Bordin & Yano (2013), essa espécie apresenta esporófito terminal, cápsula cilíndrica e peristômio simples (do tipo scariosus).

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Morro do Francês, 21/XI/1989, solo no morro, 40 m alt., *O. Yano & D.P. Costa* 13642 (SP228529); Alojamento do ICMBio, 01/XI/2013, cimento na mureta, próximo ao alojamento, 55 m alt., *Pereira et al.* 50 (UB169758); Reservatório do Pico, 02/XI/2013, rocha, 87 m alt., *Pereira et al.* 71 (UB169780); Margem da BR, indo para Morro do Pico, 02/XI/2013, cimento, 61 m alt., *Pereira et al.* 74 (UB169782); Baía dos Golfinhos, 03/XI/2013, rocha, na trilha, 65 m alt., *Pereira et al.* 88 (UB169793); Capim Açú (Sapata), 04/XI/2013, tronco morto, na trilha, 159 m alt., *Pereira et al.* 142 (UB169847); Trilha do Abreu, 04/XI/2013, solo, de baixo de rocha, 51 m alt., *Pereira et al.* 159 (UB169864); Vila dos Remédios, 05/XI/2013, tronco morto, ao lado da igreja, 51 m alt., *Pereira et al.* 176 (UB169882); Praia do Americano, 05/XI/2013, solo, na trilha com descida para a praia, 43 m alt., *Pereira et al.* 184 (UB169891); Trilha para Vila da Vacaria, 06/V/2014, solo, 82 m alt., *Pereira et al.* 304 (UB174493).

Distribuição geográfica: África, América do Norte, América Central, América do Sul. No Brasil: AC, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RO, RS, SE, SP, TO e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Nova citação para Fernando de Noronha, bastante distribuída na ilha. Facilmente encontrada durante o período de seca, em coletas que ocorreram no período chuvoso, raramente identificou-se essa espécie. Algumas plantas apresentam papilas bem sutis, difíceis de serem visualizadas, o que dificultou bastante a identificação da espécie. Planta muito similar a *Fissidens lindbergii*. Pode ser diferenciada pela presença de células lisas e gemas clavadas no caulídio, algumas vezes.

***Fissidens goyazensis* Broth., Hedwigia 34: 120. 1895.**

Gametófitos não flabelados, verde-claros a verde-escuros; nódulos axilares hialinos presentes no caulídio. Filídios em disposição dística oblongo-lanceolados, com limbídio confluyente com o ápice ou finalizando 6-8 células abaixo; costa percurrente a excurrente. Células da lâmina do filídio unipapilosas, irregulares, curto-hexagonais na região mediana superior e

células justacostais curto-retangulares a quadráticas na base da lâmina vaginante. Esporófito não visualizado. Segundo Bordin & Yano (2013), essa espécie apresenta esporófito terminal, cápsula cilíndrica e peristômio avermelhado simples (do tipo scariosus).

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Morro do Pico, 31/VII/1978, solo sob vegetação baixa e rala, próximo à base do Pico, *D.M. Vital* 8347 (SP133200); Alto Dois Abraços, 02/VIII/1978, em solo úmido, a sombra de uma árvore, *D.M. Vital* 8330 (SP147373); Morro da Madeira, 17/XI/1989, rocha na base do morro, em frente à Baía do Sueste, *D.P. Costa & O. Yano* 1038 (SP228609); Baía dos Golfinhos, 03/XI/2013, rocha, na trilha para o mirante, 65 m alt., *Pereira et al.* 85 (UB169790); Praia do Sancho, 03/XI/2013, solo, próximo à trilha para praia, 64 m alt., *Pereira et al.* 93 (UB169798); Capim Açú (Sapata), 04/XI/2013, solo, na trilha, 159 m alt., *Pereira et al.* 110 (UB169814); Cacimba do Padre, 04/V/2014, solo, próximo à mata, 44 m alt., *Pereira et al.* 229 (UB174417); Trilha para Vila da Vacaria, 06/V/2014, solo, 82 m alt., *Pereira et al.* 303 (UB174492); Estrada velha do Sueste, indo para o Morro do Abreu, 09/V/2014, solo, 43 m alt., *Pereira et al.* 453 (UB174642).

Distribuição geográfica: América do Norte, América Central, América do Sul. No Brasil: AM, BA, CE, DF, GO, MG, PB, PE, PI, RJ, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Planta bastante similar a *Fissidens angustifolius*. A principal diferença entre estas são as células justacostais longo-retangulares na base da lâmina vaginante em *F. angustifolius*, enquanto que *F. goyazensis* apresenta células justacostais curto-retangulares ou quadráticas na base da lâmina vaginante.

***Fissidens hornschurchii* Mont., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 14: 342. 1840.**

Gametófitos não flabelados, verde-escuros a amarelados; nódulos axilares hialinos presentes ou ausentes no caulídio. Filídios em disposição dística, oblongo-lanceolados, limbídio apenas na região mediana da lâmina vaginante da maioria dos filídios, margem crenulada; costa subpercurrente. Células da lâmina do filídio unipapilosas, quadráticas a pentagonais, célula apical hialina. Esporófito não visualizado. Segundo Bordin & Yano (2013), essa espécie apresenta esporófito terminal, cápsula cilíndrica e peristômio simples (do tipo scariosus).

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Morro da Madeira, 17/XI/1989, parede de rocha arenosa, exposta ao sol, *O. Yano & D.P. Costa* 13592 (SP228509); Capim Açú (Sapata), 04/XI/2013, solo, na trilha, 159 m alt., *Pereira et al.* 109 (UB169813); Morro do Piquinho, 06/V/2013, solo entre rochas, na base do morro, próximo à caverna, 164 m alt., *Pereira et al.* 301 (UB174490).

Distribuição geográfica: América Central, América do Sul. No Brasil: AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RO, RS, SC, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: *Fissidens hornschurchii* é semelhante a *F. lagenarius* e *F. submarginatus*. Esta difere de *F. hornschurchii* por apresentar limbídio em toda a lâmina vaginante. Já *F. lagenarius* difere por não ter célula apical hialina. As células da margem *F. hornschurchii* apresentam projeção papilosa, o que facilita a identificação.

***Fissidens lagenarius* Mitt., J. Linn. Soc., Bot. 10: 184. 1868.**

Gametófitos não flabelados, verde-claros a castanhos; nódulos axilares hialinos ausentes no caulídio. Filídios em disposição dística, oblongos, limbídio apenas na lâmina vaginante dos filídios periqueciais; margem crenulada; costa subpercurrente. Células da lâmina do filídio unipapilosas, arredondadas e irregulares. Esporófito não visualizado. Segundo Bordin & Yano (2013), essa espécie apresenta esporófito terminal, cápsula cilíndrica e peristômio simples (anômalo).

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Morro do Pico, 31/VII/1978, sobre solo úmido entre grandes rochas, próximo à base do Pico, *D.M. Vital* 8323 (SP147368); Morro do Piquinho, 01/XI/2013, rocha, na base do morro, 147 m alt., *Pereira et al.* 57 (UB169764).

Distribuição geográfica: América Central, América do Norte, América do Sul. No Brasil: AM, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PA, PE, PI, PR, RJ, RS, RO, SC, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Nova citação para Fernando de Noronha, encontrada apenas nas proximidades do Morro do Pico. A primeira amostra foi coletada em 1978, no entanto, fora identificada como sendo *Fissidens hornschurchii*. Demonstra similaridade com *F. hornschurchii*, distinguindo-se por não desenvolver célula apical hialina. Pode variar os padrões de limbídio na lâmina vaginante ou até mesmo não apresentá-los em plantas jovens.

***Fissidens lindbergii* Mitt., J. Linn. Soc., Bot. 12: 602. 1869.**

Gametófitos flabelados, verde-claros a amarelados; nódulos axilares hialinos presentes ou ausentes no caulídio. Filídios em disposição dística, lanceolados, limbídio finalizando 1-3 células abaixo do ápice; costa subpercurrente, finalizando 11-18 células abaixo do ápice. Células da lâmina do filídio unipapilosas, com paredes sinuosas, irregulares, na região mediana superior hexagonais a romboidais e na região basal retangulares. Esporófito não visualizado. Segundo Bordin & Yano (2013), essa espécie apresenta esporófito terminal.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Vila dos Remédios, 03/VIII/1978, solo de barrancos úmidos ao sol, *D.M. Vital* 8342 (SP147380), como *Fissidens palmatus*; Forte dos Remédios, 03/VIII/1978, solo de barrancos úmidos à sombra, *D.M. Vital* 8340 (SP147379), como *Fissidens palmatus*; Alto Dois Abraços, 02/VIII/1978, solo de barrancos úmidos à sombra, *D.M. Vital* 8329 (SP147372), como *Fissidens palmatus*; Campo de Aviação, 31/VII/1978, solo úmido, junto ao campo, *D.M. Vital* 8328 (SP147371), como *Fissidens palmatus*; Baía dos Golfinhos, 03/XI/2013, rocha próximo à trilha para o mirante, 65 m alt., *Pereira et al.* 89 (UB169794); Praia do Sancho, 03/XI/2013, rocha e solo, na trilha para a praia, 64 m alt., *Pereira et al.* 98

(UB169803); Capim Açú (Sapata), 04/XI/2013, rocha, na trilha para o mirante, 159 m alt., *Pereira et al.* 141 (UB169791); Morro do Francês, 06/XI/2013, cimento, no chão próximo da casinha, 195 m alt., *Pereira et al.* 189 (UB169895); Trilha para a Praia do Bode, 04/V/2014, solo, na margem da trilha, 26 m alt., *Pereira et al.* 215 (UB174403); Praia do Bode, 04/V/2014, solo, próximo a um curso d'água, 29 m alt., *Pereira et al.* 223 (UB174411); Cacimba do Padre, 04/V/2014, cimento das ruínas da cacimba, 44 m alt., *Pereira et al.* 226 (UB174414); Praça Flamboyant, 05/V/2014, solo, 93 m alt., *Pereira et al.* 247 (UB174435); Riacho Mulungu, 05/V/2014, solo entre rochas, 60 m alt., *Pereira et al.* 277 (UB174465); Margem da BR, 06/V/2014, rocha, 80 m alt., *Pereira et al.* 282 (UB174471); Morro do Piquinho, 06/V/2014, rochas, na base do morro, 164 m alt., *Pereira et al.* 289 (UB174478); Trilha para a Vila da Vacaria, 06/V/2014, solo, 84 m alt., *Pereira et al.* 305 (UB174494); Praia do Leão, 07/V/2014, solo entre rochas, de frente para a praia, 25 m alt., *Pereira et al.* 341 (UB174530); ICMBio, 08/V/2014, solo, 55 m alt., *Pereira et al.* 352 (UB174540); Trilha do Atalaia, 08/V/2014, solo, 19 m alt., *Pereira et al.* 356 (UB174544); Estrada velha do Atalaia, 08/V/2014, rocha, 18 m alt., *Pereira et al.* 357 (UB174545); Morro da Madeira, 08/V/2014, solo, próximo à base do morro, 52 m alt., *Pereira et al.* 361 (UB174549); Trilha grande do Atalaia, 08/V/2014, solo, 81 m alt., *Pereira et al.* 378 (UB174566); Vila Quixaba, 09/V/2014, solo, 83 m alt., *Pereira et al.* 383 (UB174571); Farol da Sapata, 09/V/2014, solo, 185m alt., *Pereira et al.* 441 (UB174629); Estrada velha do Sueste, indo para o Morro do Abreu, 09/V/2014, em solo, 43 m alt., *Pereira et al.* 454 (UB174643); Morro do Abreu, 09/V/2014, em solo, 43 m alt., *Pereira et al.* 462 (UB174651).

Distribuição geográfica: América Central, América do Norte, América do Sul. No Brasil: BA, CE, DF, GO, PB, PE, RJ, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Nova citação para Fernando de Noronha, apesar de haver amostras coletadas em 1978 e citadas por Vital *et al.* (1991). No entanto, estas amostras foram identificadas como sendo *Fissidens palmatus*. *F. lindbergii* é muito semelhante a *F. flaccidus* e *F. palmatus*, em que podem ser diferenciadas por suas células lisas, já que *F. lindbergii* exibe papilas em suas células.

Planta encontrada frequentemente associada a *Fissidens angustifolius*, *Gemmabryum apiculatum*, *Plaubelia sprengelii* e *Splachnobryum obtusum*, ou formando tapetes.

***Fissidens palmatus* Hedw., Sp. Musc. Frond. 154. 1801.**

Gametófitos flabelados, verde-claros a verde-amarelados; nódulos axilares hialinos ausentes no caulídio. Filídios em disposição dística, lanceolados a oblongo-lanceolados, limbídio em todo o filídio, confluyente com o ápice ou finalizando com algumas células abaixo; costa subpercurrente, finalizando 10-20 células abaixo do ápice. Células da lâmina do filídio lisas, hexagonais a romboidais, células da região mediana do filídio dispostas em diagonal com relação à costa. Esporófito não visualizado. Segundo o autor de

sua obra princeps, esta espécie apresenta esporófito terminal, cápsula oblonga e oblíqua e opérculo rostrado.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Praia do Sancho, 03/XI/2013, rocha, na trilha para a praia, 64 m alt., *Pereira et al.* 101 (UB169806); Vila dos Remédios, 05/VI/2014, solo entre rochas, ao lado da igreja, 49 m alt., *Pereira et al.* 273 (UB174461); Forte dos Remédios, 03/VIII/1978, solo próximo à estrada, *D.M. Vital* 8341 (SP133199); Alto dois abraços, 02/VIII/1978, solo, próximo ao morro do farol, *D.M. Vital* 8335 (SP133197).

Distribuição geográfica: América Central, América do Norte, América do Sul. No Brasil: AC, BA, CE, GO, MA, PE, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Planta muito similar a *Fissidens flaccidus*, com diferenças tais como células organizadas em diagonal com relação à costa e ausência de gemas clavadas no caulídio. Esta espécie merece atenção especial, pois foi encontrada apenas em dois pontos de coleta na expedição de 2013 e em poucas quantidades.

A descrição do esporófito de *F. palmatus* foi encontrada apenas em sua obra princeps, não mais sendo encontrados registros na literatura recente. Porém, no trabalho de Pasiche-Lisboa & Sastre-De Jesús (2014) amostras de solos com propágulos de *F. palmatus* produziram grandes quantidades de gametófitos. Assim, supõe-se que essa planta pode ter maior sucesso em reproduzir-se assexuadamente.

***Fissidens submarginatus* Bruch in Kraus, Flora 29:133. 1846.**

Gametófitos não flabelados, verde-claros a verde-amarelados; nódulos axilares hialinos ausentes no caulídio. Filídios em disposição dística, oblongos a lanceolados, limbídio apenas na lâmina vaginante de todos os filídios; margem crenulada; costa percurrente. Células da lâmina do filídio unipapilosas, células da região mediana superior do filídio arredondadas e da região basal quadráticas a retangulares. Esporófito não visualizado. Segundo Bordin & Yano (2013), essa espécie apresenta esporófito terminal, cápsula arredondada e peristômio simples (do tipo scariosus).

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Vila dos Remédios, 03/VIII/1978, solo, *D.M. Vital* 8338 (SP147377).

Distribuição geográfica: África, América Central, América do Norte, América do Sul. No Brasil: AC, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RS, SC, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Espécie anteriormente citada como planta comum por *Vital et al.* (1991), no entanto, desde a primeira coleta em 1978, não foi mais encontrada na ilha. *Fissidens submarginatus* é bastante similar à *F. hornschurchii*, podendo ser diferenciada principalmente pela presença de limbídio em toda a lâmina vaginante, enquanto que *F. hornschurchii* apresenta limbídio apenas na região mediana da lâmina vaginante.

Em algumas plantas foi possível observar ramificações em estágios de desenvolvimento.

***Fissidens zollingeri* Mont., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 4: 114. 1845.**

Gametófitos flabelados, verde-claros a verde-amarelados; nódulos axilares hialinos presentes (bem evidentes) no caulídio. Filídios em disposição dística, oblongo-lanceolados, limbídeos em todo o filídio, confluyente com o ápice; costa percurrente. Células da lâmina do filídio lisas, células da região mediana superior arredondadas e da região basal curto-retangulares. Esporófito não visualizado. Segundo Bordin & Yano (2013), essa espécie apresenta esporófito terminal, cápsula cilíndrica e peristômio simples (do tipo scariosus).

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Capim Açú (Sapata), 04/XI/2013, solo, na trilha, 159 m alt., *Pereira et al.* 112 (UB169816); Farol da Sapata, 09/V/2014, solo, 185m alt., *Pereira et al.* 438 (UB174626); Alto da Bandeira (Sapata), 04/VIII/1978, solo próximo à estrada, *D.M. Vital* 8346 (SP147384).

Distribuição geográfica: África, América do Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Oceania. No Brasil: AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Planta considerada rara, por ser encontrada apenas na Trilha Capim Açú (Sapata). Apresenta nódulos axilares hialinos bastante evidentes, o que facilita a sua identificação em relação às outras espécies similares, como *Fissidens angustifolius*, *F. bryoides* e *F. crispus*.

### Pottiaceae

***Hyophiladelphus agrarius* (Hedw.) R.H. Zander, Bryologist 98: 372. 1995.**

Gametófitos verde-claros a verde-escuros. Filídios em disposição radial, lanceolados; ápice agudo; margem revoluta; costa larga, com 6-10 células de largura, excurrente, coberta por células retangulares na superfície ventral do filídio. Células da região mediana do filídio mamilosas, isodiamétricas e células da região basal retangulares e hialinas, distinguindo-se de forma gradual das células clorofiladas, parede celular espessada. Esporófito não visualizado. Segundo Sharp *et al.* (1994), a espécie apresenta esporófito alongado, torcido, com cápsula cilíndrica a elipsoidal e peristômio simples e torcido.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Vila dos remédios, 31/X/2013, cimento de muro da praça do centro comercial, 67 m alt., *Pereira et al.* 43 (UB169755); Morro do Francês, 06/XI/2013, cimento, na margem da estrada, 195 m alt., *Pereira et al.* 188 (UB169894); Mirante do Boldró, 04/V/2014, cimento, debaixo da caixa d'água, 56 m alt., *Pereira et al.* 242 (UB174430); Vila da Quixaba, 09/V/2014, cimento, 83 m alt., *Pereira et al.* 382 (UB174570).

Distribuição geográfica: América Central, América do Norte, América do Sul. No Brasil: AC, AM, BA, CE, DF, MA, MT, PA, PB, PE, RJ, RN, RO, RS, SE, SP, TO e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Espécie anteriormente citada como planta rara, com apenas uma coleta para a ilha em 1978. Nas últimas expedições, *Hyophiladelphus agrarius* foi encontrada em mais lugares, frequentemente em locais urbanizados e com incidência de luz.

***Plaubelia sprengelii*** (Schwägr.) R.H. Zander, *Bull. Buffalo Soc. Nat. Sci.* 32: 176. 1993.

Gametófitos verde-claros a verde-amarelados. Filídios em disposição radial, linear-lanceolados; ápice obtuso a mucronado; margem revoluta; costa larga, com 6-10 células de largura, subpercurrente, coberta por células quadradas a arredondadas na superfície ventral do filídio. Células da região apical do filídio mamilosas, isodiamétricas e células da região basal retangulares, hialinas, distinguindo-se de forma gradual das células clorofiladas, parede celular espessada. Esporófito não visualizado. Segundo Sharp *et al.* (1994), a espécie apresenta esporófito alongado, com cápsula elipsoidal e peristômio simples.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Vila dos Remédios, 31/X/2013, cimento, ao lado do palácio São Miguel, 54 m alt., *Pereira et al.* 15 (UB169732); Praça Flamboyant, 05/V/2014, solo, 93 m alt., *Pereira et al.* 251 (UB174439); Trilha para Vila da Vacaria, 06/V/2014, rocha, 75 m alt., *Pereira et al.* 308 (UB174494); Forte dos Remédios, 06/V/2014, cimento entre rochas, nas ruínas do forte, 63 m alt., *Pereira et al.* 328 (UB174517); Cemitério, 07/V/2014, cimento de túmulo, 98 m alt., *Pereira et al.* 333 (UB174522); Praia do Sueste, 03/VIII/1978, cimento de muro, próximo à estrada para a praia, *D.M. Vital* 8327 (SP147370)

Distribuição geográfica: América Central, América do Norte, América do Sul. No Brasil: AC, AM, BA, GO, MA, MG, MT, PE, RJ, RO, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Espécie bastante distribuída na Ilha, encontrada frequentemente em locais com incidência de luz direta. É muito similar a *Hyophiladelphus agrarius*, podendo ser diferenciada pela presença de células mamilosas no ápice dos filídios.

## **Splachnobryaceae**

***Splachnobryum obtusum*** (Brid.) Müll. Hal., *Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien* 19: 504. 1869.

Gametófitos verde-pálidos a verde-amarelados. Filídios em disposição radial, oblongos a ligulados; côncavos; ápice obtuso; margem lisa, levemente crenulada no ápice dos filídios mais antigos; costa estreita, com 2-6 células de largura, subpercurrente. Células da lâmina do filídio lisas, células da região mediana superior hexagonais a curto-retangulares, principalmente na margem, e células da região basal hexagonais a longo-retangulares. Esporófito não visualizado. Segundo Sharp *et al.* (1994), a espécie apresenta esporófito terminal, alongado, com cápsula ereta e cilíndrica e peristômio duplo.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Vila dos Remédios, 31/X/2013, cimento, ao lado do palácio São Miguel, 54 m alt., *Pereira et al.* 163-B (UB169869); Praia do Bode, 05/XI/2013, solo, na trilha próximo à entrada da praia, 78 m alt., *Pereira et al.* 183-B (UB169889); Morro do Francês, 06/XI/2013, cimento, na margem da estrada, 195 m alt., *Pereira et al.* 190 (UB169896); Praça Flamboyant, 05/V/2014, solo, 93 m alt., *Pereira et al.* 253 (UB174441); Sítio Leão, 07/V/2014, solo, no antigo viveiro de plantas,

51 m alt., *Pereira et al.* 348 (UB174536); ICMBio, 08/V/2014, solo, 55 m alt., *Pereira et al.* 351 (UB174539); Morro da Madeira, 08/V/2014, solo, na base do morro, 74 m alt., *Pereira et al.* 371 (UB174559); Vila da Quixaba, 09/V/2014, cimento, 83 m alt., *Pereira et al.* 382 (UB174570); Capim Açú (Sapata), 09/V/2014, solo, no estacionamento do início da trilha, 176 m alt., *Pereira et al.* 413 (UB174601);

Distribuição geográfica: África, América Central, América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa, Oceania. No Brasil: AC, AL, AM, AP, CE, GO, MS, RS, SP e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Espécie amplamente distribuída na Ilha, encontrada principalmente em áreas urbanizadas, ocorrendo frequentemente em associação com *Fissidens goyazensis*, *Gemmabryum apiculatum*, *G. subapiculatum* e *Hyophiladelphus agrarius*. Segundo Sharp *et al.* (1994), a espécie apresenta esporófito terminal, porém algumas amostras coletadas apresentaram estruturas de reprodução assexuada no ápice e nas laterais do caulídio.

## Stereophyllaceae

***Entodontopsis leucostega* (Brid.) Buck & Ireland, Nova Hedwigia 41: 103. 1985.**

Gametófitos pleurocárpicos, verde-escuros; caulídios prostrados e ramificados. Filídios lanceolados; côncavos; ápice acuminado; costa subpercurrente; região basal do filídio irregular entre os lados da costa. Células da lâmina do filídio lisas, longo-hexagonais e células da região basal quadráticas. Esporófito apresenta cápsula inclinada, ovóide, opérculo rostrado e peristômio duplo.

Material examinado: BRASIL. **PE: Fernando de Noronha**, Capim Açú (Sapata), 04/XI/2013, raiz de tronco vivo, na trilha, 159 m alt., *Pereira et al.* 122 (UB169826); Primeiro Mirante da Sapata, 09/V/2014, rocha, 32 m alt., *Pereira et al.* 452 (UB174641).

Distribuição geográfica: África, América Central, América do Norte, América do Sul, Ásia. No Brasil: AC, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RO, RR, SP, TO e Ilha de Fernando de Noronha.

Comentários: Única espécie pleurocárpica encontrada na Ilha. Encontrada somente nas proximidades da trilha do Capim Açú (Sapata), é bastante distribuída neste local e ocorre formando grandes tapetes tanto em troncos e raízes de árvores vivas e em decomposição quanto em rochas de áreas mais abertas. *Entodontopsis leucostega* apresenta ápice do filídio acuminado, o que a diferencia de *E. nitens*, que tem ápice do filídio obtuso.

## Discussão

O número de briófitas listadas por Vital *et al.* (1991) aumentou de 22 para 28 espécies. Onze espécies são novas citações para Fernando de Noronha. Dessas, seis espécies foram identificadas a partir das amostras do Herbário SP e também a partir das coletas de 2013 e 2014. São elas: *Fissidens*

*angustifolius*, *F. flaccidus*, *F. lagenarius*, *F. lindbergii*, *Notothylas orbiculares* e *Philonotis cernua*, e quatro espécies foram identificadas somente a partir das novas coletas: *Bryum atenense*, *Fissidens crispus*, *Gemmabryum apiculatum* e *G. subapiculatum*. A espécie *F. curvatus* foi identificada apenas em uma amostra do herbário SP, não sendo mais encontrada nas coletas seguintes.

Algumas espécies que antes eram citadas como sendo de ocorrência rara no trabalho de Vital *et al.* (1991), com apenas uma ou duas coletas, foram encontradas em mais localidades da Ilha, como é o caso de *F. hornschurchii*, *F. zollingeri*, *Hyophiladelphus agrarius* e *Plaubelia sprengellii*. Outras espécies que antes eram descritas como sendo comuns, ainda continuam sendo, *Entodontopsis leucostega* e *Calymperes palisotii* são exemplos.

De forma geral, a maioria das espécies descritas para a Ilha tem ampla distribuição no Brasil. Além de Fernando de Noronha, também estão presentes em vários estados do Brasil e ainda no México, Estados Unidos, China, Indonésia, Honduras, Venezuela, Paraguai, Bolívia, Panamá, Paraguai, dentre outros países. A brioflora de Fernando de Noronha, composta por 28 espécies, também é relativamente bem distribuída na Ilha, com exceção das espécies consideradas raras (*Bryum atenense*, *Dicranella varia*, *Fissidens curvatus*, *F. lagenarius*, *F. submarginatus* e *Philonotis cernua*), ou seja, que foram coletadas em apenas um ou dois pontos da Ilha. A distribuição restrita destas espécies na Ilha aumenta a probabilidade de extinção das mesmas, em Fernando de Noronha.

Desde a sua descoberta em 1503, o arquipélago de Fernando de Noronha vem sofrendo impactos ambientais com a ocupação antrópica desordenada. O crescimento urbano e a intensa atividade turística crescem a cada ano (Andrade *et al.*, 2008, Serafini *et al.*, 2010). Com isso a biodiversidade passou por profundas alterações de suas características naturais.

É importante ressaltar que o trabalho brioflorístico realizado por Faria *et al.* (2012) na Ilha de Trindade indicam que o número de briófitas encontradas (32 espécies) em Trindade é maior que as encontradas (28 espécies) em Fernando de Noronha. Esses resultados são intrigantes, se forem considerados parâmetros geográficos, pois como Trindade está a uma distância de aproximadamente 2 mil km do continente brasileiro, distância bem maior se comparada à do arquipélago de Noronha (545 km) e possui uma área territorial de apenas 9,8 km<sup>2</sup> (contra 26 km<sup>2</sup> de Noronha), o presumível era que Noronha apresentasse maior riqueza da brioflora. Essa diferença pode estar relacionada à intensa atividade antrópica, já que na Ilha da Trindade não há moradores e nem turistas. De acordo com o histórico de ocupação humana, desde 1737 a Ilha vem passando por intensa transformação, principalmente a partir de 1988, quando o potencial ambiental e turístico do arquipélago foi reconhecido (Teixeira *et al.*, 2003).

*Fissidens zollingeri*, *F. hornschurchii* e *Hyophiladelphus agrarius* ocorrem tanto na Ilha de Fernando de Noronha quanto na Ilha de Trindade. Apesar de estas espécies serem de ampla distribuição mundial, esse dado nos é bastante

interessante e, se investigado, pode trazer informações importantes para os estudos de fluxo gênico entre estas Ilhas e o continente.

Com tudo isso, medidas de preservação para Fernando de Noronha são fundamentais. Visto que *Riccia ridleyi*, pertencente à lista de espécies brasileiras ameaçadas de extinção (categoria CR = Criticamente em Perigo) (CNCflora, 2015), de ocorrência para Venezuela, Peru e (Fernando de Noronha) Brasil (Gradstein & da Costa, 2003), foi localizada na Ilha no período chuvoso (coleta de 2014) formando algumas populações em pontos de visitação turística e durante o período de seca (coleta de 2013) não foi encontrada na Ilha. Outras espécies que merecem atenção são *Dicranella varia* e *Fissidens lagenarius* e *F. submarginatus* que foram encontradas, em apenas um local da Ilha, o Morro do Piquinho, a 150 m. de altitude, próximo ao Morro do Pico, que é um ponto frequentado por visitantes para atividades de ecoturismo.

Cinco táxons (*Fissidens elegans*, *F. microcladus* var. *pussillissimus*, *Notothylas vitalii*, *Octoblepharum albidum* e *Pohlia* sp.), citadas por Vital et al. (1991), não foram encontradas em herbários e nem nas novas coletas de 2013 e 2014, como é o caso de *F. microcladus* var. *pussillissimus*, *Octoblepharum albidum* e *Pohlia* sp. No caso de *Fissidens elegans* e *Notothylas vitalii* não foi encontrada devido a identificações equivocadas. *F. elegans* foi reidentificada como *F. hornschurchii* e *N. vitalii* como *N. breutelii*.

*Entodontopsis leucostega*, *Fissidens curvatus* e *F. zollingeri* são espécies encontradas apenas nas proximidades da Trilha do Capim Açú (Sapata), um local que ainda apresenta formações florestais, com mata fechada e árvores de grande porte margeando a trilha. No entanto, esse local também é um ponto de visitação turística.

O Morro do Piquinho, e as Trilhas do Capim Açú (Sapata), Baía dos Golfinhos e Praia do Sancho são os pontos com maior diversidade e, portanto, que merecem maior atenção do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, órgão responsável pela fiscalização e conservação do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha (PARNAMAR-FN) e da Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha (APA-FN). Desses pontos, o Morro do Piquinho, utilizado para atividade de escalada e rapel, e a Trilha Capim Açú (Sapata), caminho para a Caverna do Capim Açú são os mais bem preservados. Baía dos Golfinhos e Praia do Sancho são locais de intensa visitação turística.

## Referências bibliográficas

- ABDALA, G. 2008. *Estudo de Determinação da Capacidade de Suporte de Fernando de Noronha – Produtos 3 e 4*. ICMBIO/ PNUD/ ELABORE. Brasília. 316p.
- ALMEIDA, F.F.M. 1955. *Geologia e Petrologia do Arquipélago de Fernando de Noronha*. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 181p.
- ALMEIDA, F.F.M.; SCHOBENHAUS, C.; CAMPOS, D.A.; QUEIROZ, E.T.; WINGE, M., & BERBERT-BORN, M.L.C. 2002. Arquipélago de Fernando de Noronha-Registro de monte vulcânico do Atlântico Sul. Pp: 361-368. In: SCHOBENHAUS, C.; CAMPOS D. A.; QUEIROZ, E.T.; WINGE

- M. & BERBERT-BORN M. L.C. (eds.). *Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil*. Brasília, DNPM/CPRM - Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP).
- ANDERSON, L.E. 1954. *Hoyer's solution as a rapid permanent mounting medium for bryophytes*. The Bryologist 57: 242-244.
- ANDRADE, L.; GOMES, V. & BORGES, M. 2008. The Ecosystemic View of the Urban Occupation of Fernando de Noronha Island in Brasil. Pp: 1-12. In: *Ecocity World Summit 2008 – 7 th International Ecocity Conference*, San Francisco: Ecocity Builders.
- BATISTELLA, M. 1993. *Cartografia Ecológica do Arquipélago de Fernando de Noronha*. Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. São Paulo. 236p.
- BORDIN, J. & YANO, O. 2013. Fissidentaceae (Bryophyta) do Brasil. *Instituto de Botânica* 350 p.
- CASTRO, J.W.A. 2009. Geologia Ambiental das ilhas Oceânicas de Trindade e Fernando de Noronha, Brasil. Pp: 33-53. In: MOHR L.V.; CASTRO, J.W.A.; COSTA, P.M.S.; ALVES, R.J.V. *Ilhas Oceânicas Brasileiras: da pesquisa ao manejo – volume II*. Brasília: MMA/Secretaria de Biodiversidade e Florestas. 502 p.
- CNCFlora, Centro Nacional de Conservação da Flora. Disponível em: <http://cncflora.jbrj.gov.br/> Acesso em 28/01/2015.
- COSTA, D.P. da; ALMEIDA, J.S. DOS S.; DIAS, N. dos S.; GRADSTEIN, S.R. & CHURCHIL, S.P. 2010. *Manual de Briologia*. Editora Interciência.
- COSTA, D.P.; PÔRTO, K.C.; LUIZI-PONZO, A.P.; ILKIU-BORGES, A.L.; BASTOS, C.J.P.; CÂMARA, P.A.E.S., PERALTA, D.F.; BÔAS-BASTOS, S.B.V.; IMBASSAHY, C.A.A.; HENRIQUES, D.K.; GOMES, H.C.S., ROCHA, M.L.; SANTOS, N.D.; SIVIERO, T.F.; VAZ-IMBASSAHY, T.F. & CHURCHILL, S.P. 2011. Synopsis of the Brazilian moss flora: checklist, synonyms, distribution and conservation. *Nova Hedwigia* 93: 277-334.
- CRANDALL-STOTLER, B.; STOTLER, R.E. & LONG, D.G. 2009. Pp: 1-54. Morphology and classification of the Marchantiophyta. In: B. GOFFINET & A.J. SHAW (eds.). *Bryophyte Biology*. Cambridge University Press.
- FARIA, A.L.A.; CARVALHO-SILVA, M.; COSTA, D.P. & CÂMARA, P.E.A.S. 2012. The bryophytes of Trindade Island, South Atlantic, Brazil. *Acta Botanica Brasilica* 26(4): 783-793.
- FERNÁNDEZ, E.G. & SERRANO, A.M.V. 2009. *Atividade biológica das Briófitas*. Âmbito Cultural Edições. 190 p.
- GEPP, A. 1891. Musci & Hepaticae. In: RIDLEY, H. N. Notes on the botany of Fernando de Noronha. *The Journal of the Linnean Society Botany* 27: 74-75.
- GOUVEIA, S.E.M.; PESSENDA, L.C.R.; LEDRU, M.P.; SIFEDDINE, A.; MENOR, E.A.; CORDEIRO, R.C.; ARAVENA, R.; BENDASSOLI, J.A.; BOULET, R.; FILIZOLA, H.F.; OLIVEIRA, S.M.B.; RIBEIRO, A.S.; FREITAS, A.M.M.; SAIA, S.E.M.G. & RICARDI-BRANCO, F.S. 2005. Estudo multi/interdisciplinar em Fernando de Noronha - PE. In: *X Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário. Qual a chave para o futuro*. Instituto de Geociências – USP.
- GRADSTEIN, R.; CHURCHILL, S.Y. & SALAZAR, N. 2001. "Guide to the Bryophytes of Tropical America", *Editorial Board*, New York, EEUU. Pp: 2-32.
- GRADSTEIN, S.R. & COSTA, D.P. 2003. The hepaticae and anthocerotae of Brazil, In: *Memoirs of the New York Botanical Garden* 87: 1-273.
- GOFFINET, B.; BUCK W.R. & SHAW, A.J. 2009. Pp: 55-138. Morphology and classification of the Bryophyta. In: B. GOFFINET & A. J. SHAW (eds.). *Bryophyte Biology*. Cambridge University Press.
- ICMBio. 2013. *Plano de manejo da APA Fernando de Noronha, Rocas e São Pedro e São Paulo*. Disponível em [http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/Resumo%20Executivo\\_f.pdf](http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/Resumo%20Executivo_f.pdf) Acesso em 03/07/2013.

*Lista de Espécies da Flora do Brasil*. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/> Acesso em: 30 jan. 2014.

KÖPPEN, W.P. 1918. Klassifikation der Klimate nach Temperatur, Niederschlag und Jahreslauf. Petermanns Geographische Mitteilungen 64: 193-203.

MARKHAM, C.R. 2005. As quatro primeiras viagens de Américo Vespúcio: Reeditado em fac-símile e traduzida da edição original rara (Florença, 1505-6). London: B. Quaritch, 1893. In: *Obras emitido pela Sociedade Hakluyt*, nº 90. Traduzido com notas e uma introdução por Clements R. Markham. Disponível em [http://mith.umd.edu/eadad/html/display.php?docs=vespucci\\_letters.xml](http://mith.umd.edu/eadad/html/display.php?docs=vespucci_letters.xml) Acessado em 03/07/2003.

MITRAUD, S.F. 2001. Uso recreativo no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha: um exemplo de planejamento e implementação. *WWF Brasil-Série técnica* 8: 17-19.

MONTENEGRO, A.A.; RIBEIRO, M.R.; MONTENEGRO, S.M.; CORRÊA, M.M. & SANTOS, T.E. 2009. Potencialidades hídricas superficiais de Fernando de Noronha, PE, e alternativas para incremento da oferta. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental* 13: 931-939.

PASICHE-LISBOA, C.J. & SASTRE-DE JESÚS, I. 2014. Moss Propagules Banks in a Secondary Subtropical Moist Forest in Puerto Rico: A First Description. *American Journal of Plant Sciences* 5(09): 1394-1402.

PESSENDA, L.C.R.; GOUVEIA, S.E.M.; RICARDI-BRANCO, F.S.; LEDRU, M.P.; SIFEDDINE, A.; MENOR, E.A.; CORDEIRO, R.C.; ARAVENA, R.; BENDASSOLI, J.A.; BOULET, R.; FILIZOLA, H.F.; OLIVEIRA, S.M.B.; RIBEIRO, A.S.; FREITAS, A.M.M & SAIA, S.E.M.G. 2005. Dinâmica vegetacional e espacial do Mangue do Sueste, Fernando de Noronha (PE), desde o Holoceno Médio. In: *X Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário. Qual a chave para o futuro*. Instituto de Geociências – USP.

REESE, W.D. 1993. Calymperaceae. *Flora Neotropica. Monograph* 58. New York, The New York Botanical Garden. 101 p.

RENZAGLIA, K.S. & VAUGHN, K.C. 2009. Pp: 56-139. New insights into morphology, Anatomy, development, and classification of hornworts. In: A. J. SHAW & B. GOFFINET (eds.). *Bryophyte biology*. Cambridge University Press.

RIDLEY, H.N. 1890. Notes on the botany of Fernando de Noronha. *The Journal of the Linnean Society Botany* 27: 1-20.

SCHUMACKER, R. (ed.). 1985. Atlas de distribution des bryophytes de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et des régions limitrophes: Anthocerotae et Hepaticae, *Jardin Botanique National de Belgique*. 1: 1830-1984. 41p.

SHARP, A.J.; CRUM, H.A. & ECKEL, P. 1994. The moss flora of Mexico. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 69: 1-1113.

SHAW, A.J. 2009. Bryophyte species and speciation. *Bryophyte Biology*. Cambridge University Press: Cambridge.

SERAFINI, T.Z.; FRANÇA, G.B.D. & ANDRIGUETTO-FILHO, J.M. 2010. Ilhas oceânicas brasileiras: biodiversidade conhecida e sua relação com o histórico de uso e ocupação humana. In: *Revista da Gestão Costeira Integrada* 10(3): 281-301.

SILVA JÚNIOR, J.M. 2003. 2: 335-342. Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha: uso público, importância econômica e proposta de manejo. In: *2º Simpósio de Áreas Protegidas - Conservação no Âmbito do Cone Sul*.

TAVARES, R.; DE ARAÚJO, A.P.M.; MONTENEGRO, S.M.G.L.; MONTENEGRO, A.A.A. & ARRUDA, V.M. 2009. Abastecimento hídrico no arquipélago Fernando de Noronha-PE. *XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos*.

TEIXEIRA, W.; CORDANI, U.G.; MENOR, E.A.; TEIXEIRA, M.G. & LINSKER, R. 2003. *Arquipélago Fernando de Noronha: O paraíso do vulcão*. São Paulo, Terra Virgem. 167p.

VIRTANEN, R. 2014. Diaspore and shoot size as drivers of local, regional and global bryophyte distributions. *Global Ecology and Biogeography* 23(6): 610-619.

VITAL, D.M.; GIANCOTTI, C. & PURSELL, R.A. 1991. The Bryoflora of Fernando de Noronha, Brasil. *Tropical Bryology* 4: 23-24.

YANO, O & PERALTA, D.F. 2007. *Flora dos estados de Goiás e Tocantins – Criptógamas: Musgos (Bryophyta)* 6: 1-331.

YANO, O. 1984. Briófitas. Pp: 27-30 In: O. FIDALGO & BONONI V. L. R. (coords.). *Técnicas de coleta, preservação e herborização de material botânico*. Instituto de Botânica, São Paulo, Manual.




Figura 1: Mapa mostrando a localização do Arquipélago de Fernando de Noronha com relação ao Brasil e os pontos de coleta realizados nas expedições de 2013 e 2014.